

ជ្រើសរើសសម្រាប់ពិសេស

សិក្សាអនុគមន៍លោការីតនៃពេលវេលា  
លំហាត់និងដំណោះស្រាយ



គ្រឿងប្រឡូកសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិឆ្នាំ២០១៧

រៀបរៀងដោយ លីម ផល្គុន

សាក្សីចារករណីតវិទ្យាសាលាបហាសាក្សី

ស្របតាមកម្មវិធីសិក្សារបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា

**លំហាត់ទី០១**

គេឲ្យអនុគមន៍  $f$  កំណត់លើ  $(0, +\infty)$  ដោយ  $f(x) = x^2 - 2 - 2\ln x + (\ln x)^2$

(C) ជាក្រាបតំណាងអនុគមន៍  $f$  ក្នុងតម្រុយអរតូនរម៉ាល់  $(o, \vec{i}, \vec{j})$  ។

១. ចូរគណនាលីមីតនៃ  $f(x)$  កាលណា  $x \rightarrow 0^+$  និង  $x \rightarrow +\infty$  ។

២. ចូរស្រាយថាគ្រប់  $x > 0$  គេបាន  $f'(x) = \frac{2}{x}(x^2 - 1 + \ln x)$  ។

៣. គេយក  $g(x) = x^2 - 1 + \ln x$  គ្រប់  $x > 0$  ។

ក) គណនា  $g'(x)$  រួចទាញថា  $g$  ជាអនុគមន៍កើនលើ  $(0, +\infty)$  ។

ខ) គណនា  $g(1)$  រួចសិក្សាសញ្ញានៃ  $g(x)$  លើចន្លោះ  $(0, 1)$  និង  $(1, +\infty)$  ។

៤. ប្រើលទ្ធផលខាងលើចូរបញ្ជាក់សញ្ញានៃ  $f'(x)$  លើចន្លោះ  $(0, +\infty)$  ។

រក  $f(1)$  រួចគូសតារាងអថេរភាពនៃ  $f$  ។

៥. គណនា  $f\left(\frac{1}{e}\right)$  និង  $f(2)$  រួចចូរស្រាយបញ្ជាក់ថាសមីការ  $f(x) = 0$  មានឫស

ពីរ  $\alpha$  និង  $\beta$  ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់  $\frac{1}{e} < \alpha < 1 < \beta < 2$  ។ ចូរសង់ក្រាប(C) ។

**ដំណោះស្រាយ**

១. គណនាលីមីតនៃ  $f(x)$  កាលណា  $x \rightarrow 0^+$  និង  $x \rightarrow +\infty$

យើងមាន  $f(x) = x^2 - 2 - 2\ln x + (\ln x)^2$

យើងបាន  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} [x^2 - 2 - 2\ln x + (\ln x)^2] = +\infty$

ព្រោះ  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$  ។

ហើយ  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} [x^2 - 2 - 2\ln x + (\ln x)^2]$   
 $= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[ x^2 \left( 1 - \frac{2}{x^2} - \frac{2\ln x}{x^2} + \frac{(\ln x)^2}{x^2} \right) \right] = +\infty$

ព្រោះ  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$  ។

២. ស្រាយថាគ្រប់  $x > 0$  គេបាន  $f'(x) = \frac{2}{x}(x^2 - 1 + \ln x)$

យើងមាន  $f(x) = x^2 - 2 - 2\ln x + (\ln x)^2$

យើងបាន  $f'(x) = 2x - \frac{2}{x} + \frac{2\ln x}{x} = \frac{2}{x}(x^2 - 1 + \ln x)$  ពិត

ដូចនេះគ្រប់  $x > 0$  គេបាន  $f'(x) = \frac{2}{x}(x^2 - 1 + \ln x)$  ។

៣. ក) គណនា  $g'(x)$  រួចទាញថា  $g$  ជាអនុគមន៍កើនលើ  $(0, +\infty)$

យើងមាន  $g(x) = x^2 - 1 + \ln x$  គ្រប់  $x > 0$

យើងបាន  $g'(x) = 2x + \frac{1}{x} = \frac{2x^2 + 1}{x}$  ។

ដោយគ្រប់  $x > 0$  យើងមាន  $g'(x) = \frac{2x^2 + 1}{x} > 0$  នោះ  $g$  ជាអនុគមន៍កើន

ជានិច្ចលើចន្លោះ  $(0, +\infty)$  ។

ខ) គណនា  $g(1)$  រួចសិក្សាសញ្ញានៃ  $g(x)$  លើចន្លោះ  $(0, 1)$  និង  $(1, +\infty)$

យើងបាន  $g(1) = 1 - 1 + \ln 1 = 0$  ។

ដោយ  $g$  ជាអនុគមន៍កើនជានិច្ចលើចន្លោះ  $(0, +\infty)$  នោះយើងអាចសន្និដ្ឋាន

សញ្ញានៃ  $g(x)$  ដូចតទៅ៖

ចំពោះគ្រប់  $x \in (0, 1)$ :  $g(x) < 0$  ។

ចំពោះគ្រប់  $x \in (1, +\infty)$ :  $g(x) > 0$  ។

៤. បញ្ជាក់សញ្ញានៃ  $f'(x)$  លើចន្លោះ  $(0, +\infty)$

ដោយ  $f'(x) = \frac{2}{x}(x^2 - 1 + \ln x) = \frac{2g(x)}{x}$  នោះ  $f'(x)$  មានសញ្ញាដូច  $g(x)$  ។

ដូចនេះចំពោះគ្រប់  $x \in (0, 1)$ :  $f'(x) < 0$  និងគ្រប់  $x \in (1, +\infty)$ :  $f'(x) > 0$  ។

រក  $f(1)$  រួចគូសតារាងអថេរភាពនៃ  $f$  ៖

យើងបាន  $f(1) = 1^2 - 2 - 2\ln 1 + (\ln 1)^2 = 1 - 2 = -1$  ។

ដូចនេះ  $f(1) = -1$  ។

**លំហាត់សិក្សាអនុគមន៍ច្រើនអ៊ែសពិសេស**

$x$	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	$+\infty$	-1	$+\infty$

៥. គណនា  $f\left(\frac{1}{e}\right)$  និង  $f(2)$  រួចស្រាយបញ្ជាក់ថាសមីការ  $f(x) = 0$  មានឫស

ពីរ  $\alpha$  និង  $\beta$  ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់  $\frac{1}{e} < \alpha < 1 < \beta < 2$  ៖

យើងមាន  $f(x) = x^2 - 2 - 2\ln x + (\ln x)^2$

យើងបាន  $f\left(\frac{1}{e}\right) = \frac{1}{e^2} - 2 - 2\ln\frac{1}{e} + \left(\ln\frac{1}{e}\right)^2 = 0.2 - 2 + 2 + 1 = 1.2$

និង  $f(2) = 2^2 - 2 - 2\ln 2 + (\ln 2)^2 = 4 - 2 - 2(0.7) + (0.7)^2 = 1.09$  ។

ដូចនេះ  $f\left(\frac{1}{e}\right) = 1.2$  និង  $f(2) = 1.09$  ។

គេមាន  $f(1) = -1$  ហើយ  $f\left(\frac{1}{e}\right) = 1.2$  និង  $f(2) = 1.09$

ដោយ  $f\left(\frac{1}{e}\right)f(1) = -1.2 < 0$  និង  $f(1)f(2) = -1.09 < 0$


នោះតាមទ្រឹស្តីបទតម្លៃកណ្តាលយ៉ាងហោចណាស់មាន  $\alpha \in \left(\frac{1}{e}, 1\right)$  និង

$\beta \in (1, 2)$  ដែល  $f(\alpha) = 0$  និង  $f(\beta) = 0$  ។

ដូចនេះសមីការ  $f(x) = 0$  មានឫសពីរ  $\alpha$  និង  $\beta$  ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់

$\frac{1}{e} < \alpha < 1 < \beta < 2$  ។

សង់ក្រាប(C) ៖



**លំហាត់ទី០២**

គេឲ្យអនុគមន៍  $f$  កំណត់លើ  $\mathbb{R}$  ដោយ  $f(x) = x + 4 - e^x$  មានក្រាប(C) ។

១. រកលីមីតនៃ  $f(x)$  កាលណា  $x \rightarrow -\infty$  និង  $x \rightarrow +\infty$  ។

២. ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថាបន្ទាត់(d) :  $y = x + 4$  ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃខ្សែកោង

(C) កាលណា  $x \rightarrow -\infty$  ។ សិក្សាទីតាំងធៀបរវាងខ្សែកោង(C) និង(d) ។

៣. គណនាដេរីវេ  $f'(x)$  រួចគូសតារាងអថេរភាពនៃ  $f$  ។

៤. គណនា  $f(-2), f(-1), f(1)$  និង  $f(2)$  រួចសង់ក្រាប(C) នៅក្នុងតម្រុយ

អរតូនរម៉ាល់  $(o, \vec{i}, \vec{j})$  ។

៥. គណនាផ្ទៃក្រឡានៃផ្ទៃកប្បង់ខណ្ឌដោយខ្សែកោង(C) និងអក្សរ  $(ox)$  និង

បន្ទាត់ឈរ  $x = -3$  និង  $x = 1$  ។ (គេឲ្យ  $e = 2.7, e^{-1} = 0.4, e^{-2} = 0.2$  )

**ដំណោះស្រាយ**

១. រកលីមីតនៃ  $f(x)$  កាលណា  $x \rightarrow -\infty$  និង  $x \rightarrow +\infty$

យើងបាន  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (x + 4 - e^x) = -\infty$

និង  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x + 4 - e^x) = +\infty$  ។

២. ស្រាយបញ្ជាក់ថាបន្ទាត់  $(d): y = x + 4$  ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃខ្សែកោង

(C) កាលណា  $x \rightarrow -\infty$

យើងមាន  $f(x) - y = -e^x$  ដោយ  $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - y] = -\lim_{x \rightarrow -\infty} (e^x) = 0$

ដូចនេះ  $(d): y = x + 4$  ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃខ្សែកោង (C) កាលណា  $x \rightarrow -\infty$  ។

សិក្សាទីតាំងធៀបរវាងខ្សែកោង (C) និង  $(d)$  ៖

យើងមាន  $f(x) - y = -e^x < 0 \forall x \in \mathbb{R}$

ដូចនេះខ្សែកោង (C) ស្ថិតនៅពីក្រោមបន្ទាត់  $(d)$  ជានិច្ច។

៣. គណនាដេរីវេ  $f'(x)$  រួចគូសតារាងអថេរភាពនៃ  $f$

យើងមាន  $f(x) = x + 4 - e^x$

យើងបាន  $f'(x) = 1 - e^x$  ។

បើ  $f'(x) < 0 \Leftrightarrow 1 - e^x < 0 \Leftrightarrow x > 0$

បើ  $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 1 - e^x = 0 \Leftrightarrow x = 0$

បើ  $f'(x) > 0 \Leftrightarrow 1 - e^x > 0 \Leftrightarrow x < 0$

$x$	$-\infty$	$0$	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	$-\infty$	3	$-\infty$

## លំហាត់សិក្សាអនុគមន៍ច្រើនអិសពិសេស

៤. គណនា  $f(-2), f(-1), f(1)$  និង  $f(2)$

យើងមាន  $f(x) = x + 4 - e^x$


យើងបាន  $f(-2) = -2 + 4 - e^{-2} = 2 - 0.2 = 1.8$

$$f(-1) = -1 + 4 - e^{-1} = 3 - 0.4 = 2.6$$

$$f(1) = 1 + 4 - e = 5 - 2.7 = 2.3$$

$$f(2) = 2 + 4 - e^2 = 6 - 7.3 = -1.3$$

សង់ក្រាប (C) នៅក្នុងតម្រុយអរតូនរម៉ាល់  $(o, \vec{i}, \vec{j})$



៥. គណនាផ្ទៃក្រឡានៃផ្ទៃកប្បង់ខណ្ឌដោយខ្សែកោង (C) និងអ័ក្ស  $(ox)$  និង

បន្ទាត់ឈរ  $x = -3$  និង  $x = 1$  ៖

យើងបាន  $S = \int_{-3}^1 f(x) dx = \int_{-3}^1 (x + 4 - e^x) dx$

$$\begin{aligned}
 &= \left[ \frac{x^2}{2} + 4x - e^x \right]_{-3}^1 \\
 &= \left( \frac{1}{2} + 4 - e \right) - \left( \frac{9}{2} - 12 - e^{-3} \right) \\
 &= \frac{1}{2} + 4 - e - \frac{9}{2} + 12 + e^{-3} = 12 - e - \frac{1}{e^3}
 \end{aligned}$$

ដូចនេះ  $S = 12 - e - \frac{1}{e^3}$  (ឯកតាផ្ទៃ)

**លំហាត់ទី០៣**

អនុគមន៍  $f$  កំណត់ចំពោះគ្រប់  $x > 0$  ដោយ  $y = f(x) = 2 + \frac{\ln x}{x^2}$

ហើយមានខ្សែកោង (C) ។

១-គណនា  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  និង  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$  ។ កំណត់សមីការអាស៊ីមតូតឈរ និងអាស៊ីមតូតដេកនៃ (C) ។

២-គណនាដេរីវេ  $f'(x)$  ហើយគូសតារាងអថេរភាពនៃអនុគមន៍  $f$  ។

៣-កំណត់កូអរដោនេនៃចំណុចប្រសព្វរវាងខ្សែកោង (c) ជាមួយ

អាស៊ីមតូតដេករបស់វា ។ ចូរសង់ (c) ក្នុងតម្រុយអរតូណូម៉ាល់  $(o, \vec{i}, \vec{j})$  ។

៤-គណនាផ្ទៃក្រឡាខណ្ឌដោយខ្សែកោង (c) ជាមួយអាស៊ីមតូតដេករបស់វា

និងបន្ទាត់ឈរ  $x = 1$  ;  $x = e^{0.5}$  ។ ( $e = 2.72$  ;  $e^{0.5} = 1.65$  )

**ដំណោះស្រាយ**

1) គណនាលីមីត

គេមាន  $f(x) = 2 + \frac{\ln x}{x^2}$

គេបាន  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( 2 + \frac{\ln x}{x^2} \right) = 2$  ព្រោះ  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^2} = 0$

ហើយ  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left( 2 + \frac{\ln x}{x^2} \right) = -\infty$  ព្រោះ  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x^2} = -\infty$

ដូចនេះ  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$  ,  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$  ។



## លំហាត់សិក្សាអនុគមន៍ច្រើនអិលធីសេស

ទាញរកសមីការអាស៊ីមតូតនៃក្រាប ៖

ដោយ  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$  ,  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$

ដូចនេះបន្ទាត់  $y=2$  ជាសមីការអាស៊ីមតូតដេក និង  $x=0$  ជាសមីការអាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាប ។

2) គណនាដេរីវេ  $f'(x)$  ៖

គេមាន  $f(x) = 2 + \frac{\ln x}{x^2}$  គ្រប់  $x > 0$

គេបាន  $f'(x) = (2 + \frac{\ln x}{x^2})'$

$$= \frac{(\ln x)'x^2 - (x^2)'\ln x}{x^4} = \frac{1 \cdot x^2 - 2x \cdot \ln x}{x^4} = \frac{x(1 - 2\ln x)}{x^3} = \frac{1 - 2\ln x}{x^3}$$

ដូចនេះ  $f'(x) = \frac{1 - 2\ln x}{x^3}$  ។

សង់តារាងអថេរភាពនៃ  $f$  ៖

គេមាន  $f'(x) = \frac{1 - 2\ln x}{x^3}$  ដោយ  $x^3 > 0 \forall x > 0$  នោះ  $f'$  មានសញ្ញាដូចភាគយក

$1 - 2\ln x$  ។

-បើ  $1 - 2\ln x = 0$  នោះ  $\ln x = \frac{1}{2}$  គេទាញ  $x = e^{\frac{1}{2}}$  ឬ  $x = \sqrt{e}$  ។

-បើ  $1 - 2\ln x > 0$  នោះ  $0 < x < \sqrt{e}$

-បើ  $1 - 2\ln x < 0$  នោះ  $x > \sqrt{e}$

ចំពោះ  $x = \sqrt{e}$  គេបាន  $f(\sqrt{e}) = 2 + \frac{\ln \sqrt{e}}{e} = 2 + \frac{1}{2e} = 2.184$

តារាងអថេរភាព ៖

$x$	0	$\sqrt{e}$	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	$-\infty$	2.184	0

## លំហាត់សិក្សាអនុគមន៍ច្រើនរើសពិសេស


3) រកកូអរដោនេចំណុចប្រសព្វរវាងក្រាប និងអាស៊ីមតូតដេក ៖  
 ប្រសព្វរវាងក្រាប និងអាស៊ីមតូតដេកជាចម្លើយនៃប្រព័ន្ធសមីការ ៖

$$\begin{cases} y = 2 + \frac{\ln x}{x^2} \\ y = 2 \end{cases}$$

សមីការអាប៉ូស៊ីស  $2 + \frac{\ln x}{x^2} = 2$  ដោយ  $x > 0$  នោះសមីការសមមូល

$\ln x = 0$  នោះ  $x = 1$  ហើយ  $y = 2$  ។ ដូចនេះ  $A(1, 2)$  ។

សង់ក្រាប (c):  $y = 2 + \frac{\ln x}{x^2}$



គណនាផ្ទៃក្រឡាខណ្ឌដោយក្រាប (c) និងអាស៊ីមតូតដេកក្នុង  $[1, \sqrt{e}]$  ៖

$$S = \int_1^{\sqrt{e}} \left[ \left( 2 + \frac{\ln x}{x^2} \right) - 2 \right] dx = \int_1^{\sqrt{e}} \ln x \cdot \frac{dx}{x^2}$$

តាង  $\begin{cases} u = \ln x \\ dv = \frac{dx}{x^2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = \frac{1}{x} dx \\ v = -\frac{1}{x} \end{cases}$

គេបាន 
$$s = \left[ -\frac{\ln x}{x} \right]_1^{\sqrt{e}} + \int_1^{\sqrt{e}} \frac{dx}{x^2} = \left[ -\frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x} \right]_1^{\sqrt{e}}$$

$$= \left[ -\frac{1}{2\sqrt{e}} - \frac{1}{\sqrt{e}} \right] - [0 - 1] = -\frac{3}{2\sqrt{e}} + 1 = \frac{2\sqrt{e} - 3}{2\sqrt{e}}$$

ដូចនេះ  $s = \frac{2\sqrt{e} - 3}{2\sqrt{e}} = \frac{2(1.65) - 3}{2(1.65)} = 0.08$  (ឯកតាផ្ទៃក្រឡា) ។

**លំហាត់ទី០៤**

អនុគមន៍  $f$  កំណត់ចំពោះ  $x > 0$  ដោយ  $y = f(x) = 1 - \frac{2\ln x}{x}$  មានក្រាប  $C$  ។

១-រក  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$  និង  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  ។ រកសមីការអាស៊ីមតូតឈរ និង អាស៊ីមតូតដេកនៃក្រាប  $C$  ។

២-គណនាដេរីវេ  $f'(x)$  ហើយសង់តារាងអថេរភាពនៃអនុគមន៍  $f$  ។

៣-សង់ក្រាប  $C$  នៅក្នុងតម្រុយកូអរដោនេមួយ ។ គេឲ្យ  $e = 2.7, \frac{2}{e} = 0.7$

៤-គណនាផ្ទៃក្រឡាផ្នែកប្លង់កំណត់ដោយក្រាប  $C$  អាស៊ីមតូតដេក បន្ទាត់ឈរ  $x=1$  និង  $x=e$  ។

**ដំណោះស្រាយ**

១-រក  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$  និង  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  ។

គេបាន  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left( 1 - \frac{2\ln x}{x} \right) = +\infty$  ព្រោះ  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$  ។

និង  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( 1 - \frac{2\ln x}{x} \right) = 1$  ព្រោះ  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$  ។

រកសមីការអាស៊ីមតូតឈរ និង អាស៊ីមតូតដេកនៃក្រាប  $C$  ៖

ដោយ  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$  និង  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$  នោះបន្ទាត់  $x=0$

ជាអាស៊ីមតូតឈរ និង  $y=1$  ជាអាស៊ីមតូតដេកនៃក្រាប  $C$  ។

២-គណនាដេរីវេ  $f'(x)$  ហើយសង់តារាងអថេរភាពនៃអនុគមន៍  $f$

## លំហាត់សិក្សាអនុគមន៍ច្រើនអិសពិសេស

គេមាន  $f(x) = 1 - \frac{2 \ln x}{x}$  ,  $x > 0$

យើងបាន  $f'(x) = -2 \cdot \frac{(\ln x)'x - (x)' \ln x}{x^2} = -2 \cdot \frac{1 - \ln x}{x^2}$

ដូចនេះ  $f'(x) = \frac{2(\ln x - 1)}{x^2}$  ។

ចំពោះគ្រប់  $x > 0$  គេបាន  $f'(x) = \frac{2(\ln x - 1)}{x^2}$  មានសញ្ញាដូចភាគយក  $\ln x - 1$

-បើ  $f'(x) > 0$  គេបាន  $\ln x - 1 > 0$  ឬ  $x > e$


-បើ  $f'(x) = 0$  គេបាន  $\ln x - 1 = 0$  ឬ  $x = e$

-បើ  $f'(x) < 0$  គេបាន  $\ln x - 1 < 0$  ឬ  $x < e$

ចំពោះ  $x = e$  គេបាន  $f(e) = 1 - \frac{2 \ln e}{e} = 1 - \frac{2}{e} = 1 - (0.7) = 0.3$  ។

$x$	0		$e$		$+\infty$
$y'$		-	○	+	
$y$	$+\infty$		0.3		1

៣-សង់ក្រាប  $C$  នៅក្នុងតម្រុយកូអរដោនេមួយ ៖



**លំហាត់សិក្សាអនុគមន៍ច្រើនអ៊ែសពិសេស**

---

៤-គណនាផ្ទៃក្រឡាផ្ទៃក្នុងកំណត់ដោយក្រាប  $C$  អាស៊ីមតូតដេក បន្ទាត់ឈរ  $x=1$  និង  $x=e$

តាង  $S$  ផ្ទៃក្រឡាផ្ទៃក្នុង ដែលត្រូវរក ។

យើងបាន 
$$S = \int_1^e \left[ 1 - \left( 1 - \frac{2 \ln x}{x} \right) \right] \cdot dx$$

$$= \int_1^e \frac{2 \ln x}{x} \cdot dx = \int_1^e 2 \ln x \cdot \frac{dx}{x}$$

តាង  $u = \ln x$  នោះ  $du = \frac{dx}{x}$

ចំពោះ  $x=1$  នោះ  $u=0$  ហើយ  $x=e$  នោះ  $u=1$

គេបាន 
$$S = \int_0^1 2u \cdot du = \left[ u^2 \right]_0^1 = 1^2 - 0^2 = 1$$

ដូចនេះ  $S=1$  ( ឯកតាផ្ទៃក្រឡា ) ។

**លំហាត់ទី០៥**

គេឱ្យអនុគមន៍  $f(x) = (x-1)(e^{2x} + 1)$  ដែល  $x \in \mathbb{R}$  ។

១) ចូរគណនាលីមីត  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$  និង  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  ។

២) គណនាដេរីវេ  $f'(x)$  និង  $f''(x)$  រួចគូសតារាងអថេរភាពនៃ  $f'(x)$

( មិនបាច់រកលីមីតនៃ  $f'(x)$  ត្រង់  $-\infty$  និង  $+\infty$  ) ។

៣) កំនត់សញ្ញារបស់  $f'(x)$  រួចគូសតារាងអថេរភាពនៃអនុគមន៍  $f$

៤) ស្រាយបញ្ជាក់ថាបន្ទាត់  $(d): y = x - 1$  ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប  $(c)$

នៃ  $y = f(x)$  កាលណា  $x \rightarrow -\infty$  ។

បញ្ជាក់ទីតាំងធៀបរវាងខ្សែកោង  $(c)$  និងបន្ទាត់  $(d)$

៥) រកសមីការបន្ទាត់  $(T)$  ប៉ះនឹងខ្សែកោង  $(c)$  ហើយស្របជាមួយនឹង  $(d)$  ។

៦) គូសក្រាប  $(c)$  និងបន្ទាត់  $(d), (T)$  ក្នុងតម្រុយអរតូនរម៉ាល់  $(o, \vec{i}, \vec{j})$  ។

**ដំណោះស្រាយ**

១) គណនាលីមីត  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$  និង  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

យើងមាន  $f(x) = (x-1)(e^{2x} + 1)$

យើងបាន  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} [(x-1)(e^{2x} + 1)] = -\infty$

$$\text{ព្រោះ: } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} (x-1) = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} (e^{2x} + 1) = 1 \end{cases}$$

$$\text{និង } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} [(x-1)(e^{2x} + 1)] = +\infty \quad \text{ព្រោះ: } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} (x-1) = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} (e^{2x} + 1) = +\infty \end{cases}$$

២) គណនាដេរីវេ  $f'(x)$  និង  $f''(x)$

យើងមាន  $f(x) = (x-1)(e^{2x} + 1)$  កំនត់លើ  $D = IR$

$$\begin{aligned} \text{យើងបាន } f'(x) &= (x-1)'(e^{2x} + 1) + (e^{2x} + 1)'(x-1) \\ &= e^{2x} + 1 + 2e^{2x}(x-1) \\ &= 1 + (2x-1)e^{2x} \end{aligned}$$

$$\text{និង } f''(x) = (2x-1)'e^{2x} + (e^{2x})'(2x-1) = 4xe^{2x}$$

$$\text{ដូចនេះ: } f'(x) = 1 + (2x-1)e^{2x} \quad , \quad f''(x) = 4xe^{2x} \quad \text{។}$$


គូសតារាងអថេរភាពនៃ  $f'(x)$

យើងមាន  $f''(x) = 4xe^x$  មានឫស  $x = 0$

ចំពោះ  $x = 0$  នោះ  $f'(0) = 1 - 1 = 0$  ។

$x$	$-\infty$		$0$		$+\infty$
$f''(x)$	-		0		+
$f'(x)$	1		0		$+\infty$

៣) កំនត់សញ្ញារបស់  $f'(x)$  រួចគូសតារាងអថេរភាពនៃអនុគមន៍  $f$  តាមតារាងអថេរភាពខាងលើយើងទាញបាន  $f'(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$   
ដូចនេះ  $f'(x)$  មានសញ្ញាវិជ្ជមាន ។



៤) ស្រាយបញ្ជាក់ថាបន្ទាត់ (d):  $y = x - 1$  ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតយើងមាន  
 $f(x) = (x-1)(e^{2x} + 1) = x - 1 + (x-1)e^{2x}$  ដោយ  $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x-1)e^{2x} = 0$   
ដូចនេះ បន្ទាត់ (d):  $y = x - 1$  ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (c) ។

-បញ្ជាក់ទីតាំងធៀបរវាងខ្សែកោង (c) និងបន្ទាត់ (d)

គេមាន  $f(x) - y = (x-1)e^{2x}$  មានសញ្ញាដូច  $x-1$

-បើ  $x-1 > 0$  ឬ  $x > 1$  នោះខ្សែកោង (c) នៅលើបន្ទាត់ (d) ។

-បើ  $x-1 < 0$  ឬ  $x < 1$  នោះខ្សែកោង (c) នៅក្រោមបន្ទាត់ (d) ។

-បើ  $x-1 = 0$  ឬ  $x = 1$  នោះខ្សែកោងកាត់បន្ទាត់ត្រង់  $A(1, 0)$  ។

៥) កំនត់សមីការបន្ទាត់ (T) ប៉ះនឹងខ្សែកោង (c) ៖

តាង  $M_0(x_0, y_0)$  ជាចំណុចប៉ះរវាងបន្ទាត់ (T) និងក្រាប (c)

តាមរូបមន្តសមីការបន្ទាត់ប៉ះសរសេរ (T):  $y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$


ដោយ (T) // (d):  $y = x - 1$  នាំឱ្យ  $f'(x_0) = 1$

តែ  $f'(x_0) = 1 + (2x_0 - 1)e^{2x_0}$  គេបាន  $1 + (2x_0 - 1)e^{2x_0} = 1$

នាំឱ្យ  $x_0 = \frac{1}{2}$  ហើយ  $y_0 = f(\frac{1}{2}) = (\frac{1}{2} - 1)(e + 1) = -\frac{1}{2}(e + 1)$

គេបាន (T):  $y + \frac{1}{2}(e + 1) = 1(x - \frac{1}{2})$  នាំឱ្យ  $y = x - 1 - \frac{e}{2}$  ។

៦) គូសក្រាប (c) និងបន្ទាត់ (d), (T) ៖



**លំហាត់ទី០៦**

គេមានអនុគមន៍  $f$  កំណត់ដោយ  $y = f(x) = -x + 3 - \frac{4 \ln x}{x}$

ដែល  $x > 0$  ។ តាង (C) ជាក្រាបតាងអនុគមន៍  $f$  ក្នុងតម្រុយអរតូនរម៉ាល់  $(o, \vec{i}, \vec{j})$

១) រកលីមីតនៃ  $f$  ត្រង់  $0^+$  និង ត្រង់  $+\infty$  ។

កំណត់សមីការអាស៊ីមតូតទាំងពីរនៃក្រាប (C) ។

២) គណនាដេរីវេ  $f'(x)$  រួចកំណត់សញ្ញារបស់វាដោយដឹងថា

គ្រប់  $x > 0$  គេមាន  $x^2 + 4 - 4 \ln x > 0$  ។ សង់តារាងអប្សេរភាពនៃ  $f$  ។

៣) A ជាចំណុចប្រសព្វរវាងក្រាប (C) ជាមួយអាស៊ីមតូតដេករបស់វា

តាង (d) ជាបន្ទាត់កែងនឹងអាស៊ីមតូតដេកត្រង់ A និង (T) ជាបន្ទាត់ប៉ះ (C) ត្រង់ចំណុច A ។ ចូររកសមីការនៃបន្ទាត់ (d) និង (T) ។

៤) គណនា  $f(\frac{1}{2}), f(2)$  និង  $f(4)$  រួចសង់ (C), (d) និង (T) ។



**ដំណោះស្រាយ**

១) រកលីមីតនៃ  $f$  ត្រង់  $0^+$  និង ត្រង់  $+\infty$

គេមាន  $y = f(x) = -x + 3 - \frac{4 \ln x}{x}$  ដែល  $x > 0$

យើងបាន  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left( -x + 3 - \frac{4 \ln x}{x} \right) = +\infty$  ព្រោះ  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$

ហើយ  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( -x + 3 - \frac{4 \ln x}{x} \right) = -\infty$  ព្រោះ  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$  ។

កំណត់សមីការអាស៊ីមតូតទាំងពីរនៃក្រាប (C) ៖

ដោយ  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$  នោះបន្ទាត់  $x = 0$  ជាអាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាប (C) ។

ម្យ៉ាងទៀត  $y = f(x) = -x + 3 - \frac{4 \ln x}{x}$  ដោយ  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4 \ln x}{x} = 0$

ដូចនេះបន្ទាត់ ( $\Delta$ ):  $y = -x + 3$  ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C) ។

២) គណនាដេរីវេ

គេមាន  $y = f(x) = -x + 3 - \frac{4 \ln x}{x}$

គេបាន  $f'(x) = -1 - 4 \frac{1 - \ln x}{x^2} = \frac{-x^2 - 4 + 4 \ln x}{x^2}$

ដូចនេះ  $f'(x) = -\frac{x^2 + 4 - 4 \ln x}{x^2}$  ។


កំណត់សញ្ញា  $f'(x)$  ៖

ដោយដឹងថាគ្រប់  $x > 0$  គេមាន  $x^2 + 4 - 4 \ln x > 0$  នោះគេទាញ

$f'(x) = -\frac{x^2 + 4 - 4 \ln x}{x^2} < 0$  គ្រប់  $x < 0$  ។

សង់តារាងអថេរភាពនៃ  $f$

$x$	$0$	$+\infty$
$f'(x)$	-	
$f(x)$	$+\infty$	$-\infty$



៣) រកសមីការនៃបន្ទាត់  $(d)$  និង  $(T)$

ដោយ  $A$  ជាចំណុចប្រសព្វរវាងក្រាប  $(C)$  ជាមួយអាស៊ីមតូតដេក

$$\text{របស់វានោះវាជាគូចម្លើយនៃប្រព័ន្ធ} \begin{cases} y = -x + 3 - \frac{4 \ln x}{x} \\ y = -x + 3 \end{cases}$$

ផ្អែមសមីការពីនេះគេបាន  $-x + 3 = -x + 3 - \frac{4 \ln x}{x}$  សមមូល  $\ln x = 0$

ឬ  $x = 1$  ហើយ  $y = -1 + 3 = 2$  ។ គេបាន  $A(1, 2)$  ។

ដោយ  $(d)$  ជាបន្ទាត់កែងនឹងអាស៊ីមតូតដេក  $(\Delta): y = -x + 3$  ត្រង់  $A$

នោះសមីការ  $(d)$  មានទម្រង់  $y = x + b$  ហើយ  $A(1, 2) \in (d)$  នោះ  $2 = 1 + b$  ឬ

$b = 1$  ។ ដូចនេះ  $(d): y = x + 1$  ។

ម្យ៉ាងទៀត  $(T)$  ជាបន្ទាត់ប៉ះ  $(C)$  ត្រង់ចំណុច  $A$  នោះសមីការ  $(T)$  សរសេរ

$$(T): y = f'(1)(x-1) + f(1)$$

$$\text{ដោយ } f'(1) = -\frac{1+4-4\ln 1}{1^2} = -5, f(1) = 2$$

$$\text{គេបាន } (T): y = -5(x-1) + 2 = -5x + 7 \text{ ។}$$

$$\text{ដូចនេះ } (T): y = -5x + 7 \text{ ។}$$

៤) គណនា  $f\left(\frac{1}{2}\right), f(2)$  និង  $f(4)$  រួចសង់  $(C), (d)$  និង  $(T)$


$$\text{ដោយ } f(x) = -x + 3 - \frac{4 \ln x}{x}$$

$$\text{គេបាន } f\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2} + 3 - \frac{4 \ln\left(\frac{1}{2}\right)}{\frac{1}{2}} = 2.5 + 8(0.7) = 8.1 \text{ ។}$$

$$f(2) = -2 + 3 - \frac{4 \ln 2}{2} = 1 - 2(0.7) = -0.4 \text{ ។}$$

$$f(4) = -4 + 3 - \frac{4 \ln 4}{4} = -1 - 2 \ln 2 = -1 - 2(0.7) = -2.4 \text{ ។}$$

# លំហាត់សិក្សាអនុគមន៍ច្រើនអ៊ែសពិសេស



## លំហាត់ទី០៧

គេឲ្យអនុគមន៍  $f$  កំណត់លើចន្លោះ  $(0, +\infty)$  ដោយ  $f(x) = x + 1 - 2\ln x$

មានក្រាប  $C$  នៅក្នុងតម្រុះអរតូនរម៉ាល់  $(o, \vec{i}, \vec{j})$  ។

១) ចូររកលីមីតនៃ  $f$  ត្រង់  $+\infty$  និងត្រង់  $0$  ខាងស្តាំ។

ទាញបញ្ជាក់សមីការអាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាប  $C$  ។

២) រកដេរីវេ  $f'(x)$  រួចគូសតារាងសិក្សាសញ្ញានៃ  $f'(x)$  ។

ទាញរកតម្លៃអប្បបរមាធៀបនៃអនុគមន៍  $f$  រួចសង់តារាងអថេរភាព

៣) គណនាតម្លៃ  $f(1)$  រួចសរសេរសមីការនៃបន្ទាត់  $(T)$  ដែលប៉ះនឹងខ្សែកោង  $C$  ត្រង់ចំណុច  $x=1$  ។

៤) ចូរបង្ហាញថាគេមិនអាចគូសបន្ទាត់ប៉ះនឹងខ្សែកោង  $C$  ហើយកែងនឹងបន្ទាត់  $(T)$  បានទេ ។

៥) គណនា  $f(e)$  និង  $f(\frac{7}{2})$  រួចគូសក្រាប  $C$  ។

## លំហាត់សិក្សាអនុគមន៍ច្រើនអិលសិសេស

គេយក  $e = 2.7$ ,  $\ln 2 = 0.7$ ,  $\ln 7 = 1.95$  ។

៦) ចូរស្រាយថា  $F(x) = \frac{x^2}{2} + 3x - 2x \ln x$  ជាព្រីមីទីវមួយនៃ  $f$  លើចន្លោះ  $(0, +\infty)$

៧) ចូរគណនាផ្ទៃក្រឡា  $S_a$  នៃផ្នែកប្លង់ខណ្ឌដោយក្រាប  $C$  និងបន្ទាត់  $T$  និងបន្ទាត់ឈរ  $x = a$ ,  $x = 1$  ដែល  $0 < a < 1$  ។

គណនាលីមីតនៃ  $S_a$  កាលណា  $a$  ខិតជិតសូន្យខាងស្តាំ ។

### ដំណោះស្រាយ

១) រកលីមីតនៃ  $f$  ត្រង់  $+\infty$  និងត្រង់  $0$  ខាងស្តាំ

យើងបាន  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x + 1 - 2 \ln x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[ x \left( 1 + \frac{1}{x} - \frac{2 \ln x}{x} \right) \right] = +\infty$

ព្រោះ  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$  ។

ហើយ  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x + 1 - 2 \ln x) = +\infty$  ព្រោះ  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$  ។

ដោយ  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$  នោះបន្ទាត់  $x = 0$  ជាអាស៊ីមតូតឈរ នៃក្រាប  $C$  ។

២) រកដេរីវេ  $f'(x)$  រួចគូសតារាងសិក្សាសញ្ញានៃ  $f'(x)$

យើងមាន  $f(x) = x + 1 - 2 \ln x$

យើងបាន  $f'(x) = 1 - \frac{2}{x} = \frac{x-2}{x}$  ។

គ្រប់  $x > 0$  គេបាន  $f'(x) = \frac{x-2}{x}$  មានសញ្ញាដូច  $(x-2)$  ។

បើ  $f'(x) = \frac{x-2}{x} = 0$  នោះ  $x = 2$  ។

$x$	0	2	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+

## លំហាត់សិក្សាអនុគមន៍ច្រើនអ៊ែសពិសេស

ទាញរកតម្លៃអប្បបរមាធៀបនៃអនុគមន៍  $f$  រួចសង់តារាងអថេរភាព ៖  
តាមតារាងសិក្សាសញ្ញាខាងលើយើងឃើញថា  $f'(x)$  ប្តូរសញ្ញាពី (-) ទៅ (+) ត្រង់ចំណុច  $x=2$  ។

ដូចនេះ  $f$  មានតម្លៃអប្បបរមាធៀបត្រង់  $x=2$  គឺ

$$f(2) = 2 + 1 - 2\ln 2 = 3 - 2(0.7) = 1.6 \quad \text{។}$$

$x$	0	2	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	$+\infty$	1.6	$+\infty$

៣) គណនាតម្លៃ  $f(1)$  រួចសរសេរសមីការនៃបន្ទាត់  $(T)$

គេមាន  $f(x) = x + 1 - 2\ln x$  ចំពោះ  $x=1$  គេបាន  $f(1) = 1 + 1 - 2\ln 1 = 2$  ។

រូបមន្តសមីការបន្ទាត់ប៉ះ  $(T): y = f'(1)(x-1) + f(1)$

ដោយ  $f'(x) = \frac{x-2}{x}$  នោះ  $f'(1) = \frac{1-2}{1} = -1$

គេបាន  $(T): y = -1(x-1) + 2 = -x + 3$  ។

៤) បង្ហាញថាគេមិនអាចគូសបន្ទាត់ប៉ះនឹងខ្សែកោង  $C$  ហើយកែងនឹងបន្ទាត់  $(T)$  ៖

ឧបមាថា  $(T')$  ជាបន្ទាត់ប៉ះនឹងខ្សែកោង  $C$  ត្រង់ចំណុច  $x_0$  ។

មេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់  $(T')$  គឺ  $f'(x_0) = \frac{x_0 - 2}{x_0}$  ។

បើ  $(T') \perp (T)$  នោះ  $(-1)f'(x_0) = -1$

ឬ  $f'(x_0) = 1$  ឬ  $\frac{x_0 - 2}{x_0}$  ឬ  $x_0 - 2 = x_0$  (មិនអាច)

## លំហាត់សិក្សាអនុគមន៍ច្រើនអិលធីសេស

ដូចនេះគេមិនអាចគូសបន្ទាត់ប៉ះនឹងខ្សែកោង  $C$  ហើយកែងនឹងបន្ទាត់  $(T)$  បានទេ

៥) គណនា  $f(e)$  និង  $f(\frac{7}{2})$  រួចគូសក្រាប

គេមាន  $f(x) = x + 1 - 2\ln x$

ចំពោះ  $x = e$  នោះ  $f(e) = e + 1 - 2\ln e = 2.7 + 1 - 2 = 1.7$  ។


ចំពោះ  $x = \frac{7}{2}$  នោះ  $f(\frac{7}{2}) = \frac{7}{2} + 1 - 2\ln \frac{7}{2} = 4.5 - 2(\ln 7 - \ln 2)$   
 $= 4.5 - 2(1.95 - 0.7) = 2$

ដូចនេះ  $f(e) = 1.7$  និង  $f(\frac{7}{2}) = 2$  ។

៦) ស្រាយថា  $F(x) = \frac{x^2}{2} + 3x - 2x\ln x$  ជាព្រីមីទីវមួយនៃ  $f$

គេមាន  $F'(x) = x + 3 - 2(\ln x + 1) = x + 1 - 2\ln x = f(x)$  គ្រប់  $x > 0$

ដូចនេះ  $F(x) = \frac{x^2}{2} + 3x - 2x\ln x$  ជាព្រីមីទីវមួយនៃ  $f$  លើ  $(0, +\infty)$  ។



៧) គណនាផ្ទៃក្រឡា  $S_a$  នៃផ្ទៃកប្បង់ខណ្ឌដោយក្រាប  $C$  និងបន្ទាត់  $T$  និងបន្ទាត់ឈរ  $x = a, x = 1$  ដែល  $0 < a < 1$  ៖

$$\begin{aligned} \text{យើងបាន } S_a &= \int_a^1 [f(x) - (-x + 3)] dx = \left[ F(x) + \frac{x^2}{2} - 3x \right]_a^1 \\ &= \left[ \frac{x^2}{2} + 3x - 2x \ln x + \frac{x^2}{2} - 3x \right]_a^1 \\ &= [x^2 - 2x \ln x]_a^1 \\ &= (1 - 2 \ln 1) - (a^2 - 2a \ln a) \\ &= 1 - a^2 + 2a \ln a \end{aligned}$$

ដូចនេះ  $S_a = 1 - a^2 + 2a \ln a$  (ខ្នាតផ្ទៃ)

គណនាលីមីតនៃ  $S_a$  កាលណា  $a$  ខិតជិតសូន្យខាងស្តាំ ៖

យើងបាន  $\lim_{a \rightarrow 0^+} S_a = \lim_{a \rightarrow 0^+} (1 - a^2 + 2a \ln a) = 1$  ព្រោះ  $\lim_{a \rightarrow 0^+} a \ln a = 0$  ។

**លំហាត់ទី០៨**

គេឲ្យអនុគមន៍  $f$  កំណត់ដោយ  $f(x) = e^x(-x^2 + 2x - 1)$  ហើយមានក្រាប  $C$

១) គណនា  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$  និង  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  ។ ទាញរកសមីការអាស៊ីមតូតដេកនៃក្រាប  $C$  ។

២) គណនាដេរីវេ  $f'(x)$  សិក្សាសញ្ញាដេរីវេ រួចសង់តារាងអថេរភាពនៃ  $f$  ។

៣) គណនា  $f(-2), f(0)$  និង  $f(2)$  ។ សង់ក្រាប  $C$  ក្នុងតម្រុយ  $(o, \vec{i}, \vec{j})$  ។

៤) គណនាផ្ទៃក្រឡាផ្ទៃកប្បង់ដែលខណ្ឌដោយក្រាប  $C$ , អក្សរអាប់ស៊ីសនិងអក្សរអរដោនេ ។

**ដំណោះស្រាយ**

១) គណនាលីមីត រួចទាញរកសមីការអាស៊ីមតូតដេក ៖

គេមាន  $f(x) = e^x(-x^2 + 2x - 1) = -(x-1)^2 e^x$

គេបាន  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} [-(x-1)^2 e^x] = 0$  ព្រោះ  $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$  ។

---

## លំហាត់សិក្សាអនុគមន៍ច្រើនអ៊ែសពិសេស

ហើយ  $\lim_{x \rightarrow +\infty} [-(x-1)^2 e^x] = -\infty$  ព្រោះ  $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$  ។

ដូចនេះ  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$  និង  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$  ហើយបន្ទាត់  $y = 0$

ជាសមីការអាស៊ីមតូតដេកនៃក្រាប ( $c$ ) ។

២) គណនាដេរីវេ និងសិក្សាសញ្ញារបស់វា ៖

គេមាន  $f(x) = -(x-1)^2 e^x$  ដោយប្រើរូបមន្ត  $(uv)' = u'v + uv'$

គេបាន  $f'(x) = -2(x-1)e^x - (x-1)^2 e^x = -(x-1)e^x[2 + (x-1)]$

ដូចនេះ  $f'(x) = -(x-1)(x+1)e^x$  ។

ដោយគ្រប់  $x \in \mathbb{R} : e^x > 0$  នោះ  $f'(x)$  មានសញ្ញាដូច

$$g(x) = -(x-1)(x+1)$$

បើ  $g(x) = 0 \Leftrightarrow -(x-1)(x+1) = 0$  គេទាញ  $x_1 = -1, x_2 = 1$  ។

តារាងសញ្ញានៃ  $g(x) = -(x-1)(x+1)$

$x$	$-\infty$	$-1$	$1$	$+\infty$	
$g(x)$	-	0	+	0	-

តាមតារាងខាងលើយើងអាចសន្និដ្ឋានសញ្ញានៃ  $f'(x) = -(x-1)(x+1)e^x$

-ចំពោះ  $x \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$  គេបាន  $f'(x) < 0$

-ចំពោះ  $x \in \{-1, 1\}$  គេបាន  $f'(x) = 0$

-ចំពោះ  $x \in (-1, 1)$  គេបាន  $f'(x) > 0$

$x$	$-\infty$	$-1$	$1$	$+\infty$			
$f'(x)$	-	0	+	0	-		
$f(x)$	0	$\searrow$	$-\frac{4}{e}$	$\nearrow$	0	$\searrow$	$-\infty$



## លំហាត់សិក្សាអនុគមន៍ច្រើនអិសពិសេស

$$f(-1) = -(-1-1)^2 e^{-1} = -\frac{4}{e} ; f(1) = 0 \quad \forall$$

៣) គណនា  $f(-2)$  ,  $f(0)$  និង  $f(2)$


បើ  $x = -2$  នោះ:  $f(-2) = -(-2-1)^2 e^{-2} = -\frac{9}{e^2} = -9(0.13) = -1.17$

បើ  $x = 0$  នោះ:  $f(0) = -(0-1)^2 e^0 = -1$

បើ  $x = 2$  នោះ:  $f(2) = -(2-1)^2 e^2 = -e^2 = -7.4$

ដូចនេះ:  $f(-2) = -\frac{9}{e} = -1.17$ ,  $f(0) = -1$  និង  $f(2) = -e^2 = -7.4 \quad \forall$

សង់ក្រាប (c):  $y = f(x) = e^x(-x^2 + 2x - 1) = -(x-1)^2 e^x \quad \forall$



៤) គណនាផ្ទៃក្រឡាខណ្ឌដោយ (c) ជាមួយអ័ក្សអាប់ស៊ីស និង អ័ក្សអរដេនេ :  
 តាង S ជាផ្ទៃក្រឡានៃមណ្ឌលប្លង់ខណ្ឌដោយក្រាប (c) , អ័ក្សអាប់ស៊ីស និង  
 អ័ក្សអរដេនេ:

គេបាន  $S = \int_0^1 (x-1)^2 e^x .dx$

តាង  $\begin{cases} u = (x-1)^2 \\ dv = e^x dx \end{cases}$  នោះ  $\begin{cases} du = 2(x-1)dx \\ v = e^x \end{cases}$

គេបាន  $S = \left[ (x-1)^2 e^x \right]_0^1 - \int_0^1 2(x-1)e^x = 0 - 1 - 2 \int_0^1 (x-1)e^x .dx$

តាង  $\begin{cases} u = x-1 \\ dv = e^x dx \end{cases}$  នោះ  $\begin{cases} du = dx \\ v = e^x \end{cases}$

គេបាន  $S = -1 - 2 \left( \left[ (x-1)e^x \right]_0^1 - \int_0^1 e^x dx \right)$   
 $= -1 - 2 \left( 0 + 1 - \left[ e^x \right]_0^1 \right) = -1 - 2 + 2(e-1)$   
 $= 2e - 5 = 2(2.718) - 5 = 0.436$  (ឯកតាផ្ទៃ) ។

ដូចនេះ  $S = 0.436$  (ឯកតាផ្ទៃ) ។

**លំហាត់ទី០៩**

គេឲ្យអនុគមន៍  $f$  កំណត់ដោយ  $f(x) = \frac{e^x}{x^2}$ ,  $x \neq 0$  មានក្រាប(C)

- ១) ចូររកលីមីតនៃ  $f$  ត្រង់ ០ និង ត្រង់  $\pm\infty$  ។
- បញ្ជាក់សមីការអាស៊ីមតូតទាំងអស់របស់ក្រាប(C) ។
- ២) ចូរសង់តារាងអថេរភាពនៃ  $f$  ។
- ៣) គណនា  $f(-1)$ ,  $f(1)$  និង  $f(3)$  រួចសង់ក្រាប(C) ។  
 ( គេយក  $e^{-1} = 0.4$ ,  $e = 2.7$ ,  $e^2 = 7.3$ ,  $\frac{e^3}{27} = 0.7$  ) ។

**ដំណោះស្រាយ**

១) រកលីមីតនៃ  $f$  ត្រង់ ០ និង ត្រង់  $\pm\infty$

យើងបាន  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{x^2} = +\infty$

## លំហាត់សិក្សាអនុគមន៍ច្រើនរើសពិសេស

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{x^2} = 0 \quad \& \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2} = +\infty$$

បញ្ជាក់សមីការអាស៊ីមតូតទាំងអស់របស់ក្រាប(C) ៖

ដោយ  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$  នោះបន្ទាត់  $x=0$  ជាអាស៊ីមតូតឈរនៃ(C)

ហើយ  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$  នោះបន្ទាត់  $y=0$  ជាអាស៊ីមតូតដេកនៃ(C) ។

២) សង់តារាងអថេរភាពនៃ  $f$

$$\text{គេបាន } f'(x) = \frac{e^x x^2 - 2xe^x}{x^4} = \frac{(x-2)e^x}{x^3}$$

ចំពោះគ្រប់  $x \neq 0$  កន្សោម  $f'(x) = \frac{(x-2)e^x}{x^3}$  មានសញ្ញាដូច  $\frac{x-2}{x}$  ។

$$\text{បើ } f'(x) = \frac{(x-2)e^x}{x^3} = 0 \quad \text{នោះ } x=2 \quad \text{។}$$


$$\text{ចំពោះ } x=2 \quad \text{នោះ } f(2) = \frac{e^2}{4} = \frac{7.3}{4} = 1.8 \quad \text{។}$$

$x$	$-\infty$	$0$	$2$	$+\infty$
$f'(x)$	+		-	+
$f(x)$	0		1.8	+

៣) គណនា  $f(-1)$ ,  $f(1)$  និង  $f(3)$  រួចសង់ក្រាប(C)

$$\text{យើងបាន } f(-1) = e^{-1} = 0.4, \quad f(1) = e = 2.7, \quad f(3) = \frac{e^3}{27} = 0.7$$

$$\text{ដូចនេះ } f(-1) = 0.4, \quad f(1) = 2.7, \quad f(3) = 0.7$$



**លំហាត់ទី១០**

គេមានអនុគមន៍  $f$  កំណត់លើ  $\mathbb{R}$  ដោយ  $f(x) = x + 2 - \frac{4e^x}{e^x + 3}$  ។  
 គេតាងដោយ  $C$  ក្រាបរបស់អនុគមន៍ នៅក្នុងប្លង់ប្រដាប់ដោយតម្រុយ  
 អរតូណរម៉ាល់  $(o, \vec{i}, \vec{j})$  ។

១) a. គណនាលីមីតនៃ  $f$  ត្រង់  $-\infty$  និង  $+\infty$  ។

b. សិក្សាទីតាំងធៀបនៃក្រាប  $C$  ធៀបនឹងបន្ទាត់  $d_1$  ដែលមាន  
 សមីការ  $y = x + 2$  ។

២) a. ស្រាយបំភ្លឺថាចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត  $x, f'(x) = \left(\frac{e^x - 3}{e^x + 3}\right)^2$  ។

b. សិក្សាអថេរភាពនៃ  $f$  លើ  $\mathbb{R}$  និងសង់តារាងអថេរភាពនៃ  $f$  ។

៣) a. តើគេអាចថាយ៉ាងណាចំពោះបន្ទាត់ប៉ះ  $d_2$  ទៅនឹងក្រាប  $C$   
 ត្រង់ចំណុច  $I$  ដែលមានអាប់ស៊ីស  $\ln 3$  ។

b. សិក្សាទីតាំងនៃក្រាប  $C$  ធៀបនឹងបន្ទាត់ប៉ះ  $d_2$  ។

៤) a. បង្ហាញថាបន្ទាត់ប៉ះ  $d_3$  ទៅនឹងក្រាប  $C$  ត្រង់ចំណុចមាន

$$\text{អាប៉ស៊ីសសូន្យមានសមីការ } y = \frac{1}{4}x + 1 \text{ ។}$$

b. ដោយសន្មតថាចំណុច  $I$  ជាផ្ចិតឆ្លុះនៃក្រាប  $C$  និងក្នុងតម្លៃប្រហែលនៃ  $\ln 3$  ចូរសង់ក្រាប  $C$  និងបន្ទាត់ប៉ះ  $d_1, d_2, d_3$  ។  
( នៅលើតម្រុយនេះមួយឯកតាស្មើ  $2cm$  )

**ដំណោះស្រាយ**

១) a. គណនាលីមីតនៃ  $f$  ត្រង់  $-\infty$  និង  $+\infty$

$$\text{យើងបាន } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left( x + 2 - \frac{4e^x}{e^x + 3} \right) = -\infty$$

$$\text{ព្រោះ } \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0 \text{ ។}$$

$$\text{ហើយ } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( x + 2 - \frac{4e^x}{e^x + 3} \right) = +\infty$$

$$\text{ព្រោះ } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4e^x}{e^x + 3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4e^x}{e^x} = 4 \text{ ។}$$

b. សិក្សាទីតាំងធៀបនៃក្រាប  $C$  ធៀបនឹង  $d_1$  សមីការ  $y = x + 2$

$$\text{យកសមីការ } C \text{ ដកសមីការ } d_1 \text{ គេបាន } f(x) - y = -\frac{4e^x}{e^x + 3} < 0$$

$$\text{គ្រប់ } x \in \mathbb{R} \text{ ព្រោះ } e^x > 0 \forall x \in \mathbb{R}$$

ដូចនេះក្រាប  $C$  ស្ថិតនៅក្រោមបន្ទាត់  $d_1$  ដែលមានសមីការ  $y = x + 2$

២) a. ស្រាយបំភ្លឺថាចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត  $x, f'(x) = \left( \frac{e^x - 3}{e^x + 3} \right)^2$

$$\text{គេមាន } f(x) = x + 2 - \frac{4e^x}{e^x + 3}$$

គេអាចសរសេរដូចតទៅ៖

## លំហាត់សិក្សាអនុគមន៍ច្រើនអិសពិសេស

$$f(x) = x + 2 - \frac{4e^x}{e^x + 3} = x + 2 - \frac{4(e^x + 3) - 12}{e^x + 3}$$

$$= x + 2 - 4 + \frac{12}{e^x + 3} = x - 2 + \frac{12}{e^x + 3}$$

យើងបាន  $f'(x) = (x - 2)' - \frac{12(e^x + 3)'}{(e^x + 3)^2}$

$$= 1 - \frac{12e^x}{(e^x + 3)^2} = \frac{(e^x + 3)^2 - 12e^x}{(e^x + 3)^2}$$

$$= \frac{e^{2x} + 6e^x + 9 - 12e^x}{(e^x + 3)^2} = \frac{e^{2x} - 6e^x + 9}{(e^x + 3)^2}$$

$$= \frac{(e^x - 3)^2}{(e^x + 3)^2}$$

ដូចនេះចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត  $x$ ,  $f'(x) = \left(\frac{e^x - 3}{e^x + 3}\right)^2 \geq 0$  ។

b. សិក្សាអថេរភាពនៃ  $f$  លើ  $\mathbb{R}$  និងសង់តារាងអថេរភាពនៃ  $f$

ដោយគេមានគ្រប់ចំនួនពិត  $x$ ,  $f'(x) = \left(\frac{e^x - 3}{e^x + 3}\right)^2 \geq 0$

នោះ  $f$  ជាអនុគមន៍កើនលើ  $\mathbb{R}$  ។

បើ  $f'(x) = 0 \Leftrightarrow (e^x - 3)^2 = 0 \Leftrightarrow x = \ln 3$

ហើយ  $f(\ln 3) = \ln 3 + 2 - \frac{4e^{\ln 3}}{e^{\ln 3} + 3} = \ln 3 + 2 - \frac{12}{6} = \ln 3$

តារាងអថេរភាព

$x$	$-\infty$	$\ln 3$	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	+
$f(x)$	$-\infty$	$\ln 3$	$+\infty$

៣) a. តើគេអាចថាយ៉ាងណាចំពោះបន្ទាត់ប៉ះ  $d_2$  ទៅនឹងក្រាប  $C$  ត្រង់ចំណុច  $I$  ដែលមានអាប់ស៊ីស  $\ln 3$

$$\text{ចំពោះ } x = \ln 3 \text{ នោះ } f'(\ln 3) = \left( \frac{e^{\ln 3} - 3}{e^{\ln 3} + 3} \right)^2 = \left( \frac{3 - 3}{3 + 3} \right)^2 = 0$$

ដូចនេះបន្ទាត់ប៉ះ  $d_2$  ទៅនឹងក្រាប  $C$  ត្រង់ចំណុច  $I$

ដែលមានអាប់ស៊ីស  $\ln 3$  ជាបន្ទាត់ស្របនឹងអ័ក្ស  $ox$  ដែលមានសមីការ  $y = \ln 3$

។

b. សិក្សាទីតាំងនៃក្រាប  $C$  ធៀបនឹងបន្ទាត់ប៉ះ  $d_2$

តាមសម្រាយខាងលើយើងមាន  $f$  ជាអនុគមន៍កើនលើ  $x$

ហើយបន្ទាត់ប៉ះ  $d_2$  ទៅនឹងក្រាប  $C$  ត្រង់ចំណុច  $I$  ជាបន្ទាត់ស្របនឹង  $ox$

នោះយើងអាចសន្និដ្ឋានទីតាំងរវាងក្រាប  $C$  ធៀបនឹងបន្ទាត់ប៉ះ  $d_2$

ដូចតទៅ ៖

ចំពោះ  $x \in (-\infty, \ln 3)$  នោះក្រាប  $C$  ស្ថិតនៅក្រោមបន្ទាត់ប៉ះ  $d_2$  ។

ចំពោះ  $x = \ln 3$  ក្រាប  $C$  និងបន្ទាត់ប៉ះ  $d_2$  ប៉ះគ្នាត្រង់ចំណុច  $I(\ln 3, \ln 3)$

ចំពោះ  $x \in (\ln 3, +\infty)$  នោះក្រាប  $C$  ស្ថិតនៅលើបន្ទាត់ប៉ះ  $d_2$  ។

៤) a. បង្ហាញថាបន្ទាត់ប៉ះ  $d_3$  ទៅនឹងក្រាប  $C$  ត្រង់ចំណុចមានអាប់ស៊ីស

$$\text{សូន្យមានសមីការ } y = \frac{1}{4}x + 1$$

សមីការបន្ទាត់ប៉ះ  $d_3$  ទៅនឹងក្រាប  $C$  ត្រង់ចំណុចមានអាប់ស៊ីសសូន្យ

$$\text{មានរាង } d_3 : y = f'(0)(x - 0) + f(0)$$


$$\text{ដោយ } f'(0) = \left( \frac{e^0 - 3}{e^0 + 3} \right)^2 = \left( \frac{1 - 3}{1 + 3} \right)^2 = \frac{1}{4}$$

$$\text{និង } f(0) = 0 + 2 - \frac{4e^0}{e^0 + 3} = 1$$

## លំហាត់សិក្សាអនុគមន៍ច្រើនរើសពិសេស

ដូចនេះ  $d_3 : y = \frac{1}{4}x + 1$  ។

b. ដោយសន្មតថាចំណុច  $I$  ជាផ្ចិតឆ្លុះនៃក្រាប  $C$  និងក្នុងតម្លៃប្រហែលនៃ  $\ln 3$  សង់ក្រាប  $C$  និងបន្ទាត់ប៉ះ  $d_1, d_2, d_3$  ។



### លំហាត់ទី១១

អនុគមន៍  $f$  កំណត់ចំពោះ  $x > 0$  ដោយ  $y = f(x) = 1 - \frac{2 \ln x}{x}$

ហើយមានក្រាប  $C$  ។

១-រក  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$  និង  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  ។ រកសមីការអាស៊ីមតូតឈរ និង

អាស៊ីមតូតដេកនៃក្រាប  $C$  ។

២-គណនាដេរីវេ  $f'(x)$  ហើយសង់តារាងអថេរភាពនៃអនុគមន៍  $f$  ។

៣-សង់ក្រាប  $C$  នៅក្នុងតម្រុយអរតូនរមេ  $(o, \vec{i}, \vec{j})$  មួយ ។



៤-គណនាផ្ទៃក្រឡាផ្ទៃក្នុងកំណត់ដោយក្រាប  $C$  អាស៊ីមតូតដេក

បន្ទាត់ឈរ  $x=1$  និង  $x=e$  ។ គេឲ្យ  $e=2.7, \frac{2}{e}=0.7$

**ដំណោះស្រាយ**

១) រក  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$  និង  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  ។

គេបាន  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (1 - \frac{2 \ln x}{x}) = +\infty$  ព្រោះ  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$  ។

និង  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (1 - \frac{2 \ln x}{x}) = 1$  ព្រោះ  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$  ។

រកសមីការអាស៊ីមតូតឈរ និង អាស៊ីតតូតដេកនៃក្រាប  $C$  ៖

ដោយ  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$  និង  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$  នោះបន្ទាត់  $x=0$

ជាអាស៊ីមតូតឈរ និង  $y=1$  ជាអាស៊ីមតូតដេកនៃក្រាប  $C$  ។

២) គណនាដេរីវេ  $f'(x)$  ហើយសង់តារាងអថេរភាពនៃអនុគមន៍  $f$

គេមាន  $f(x) = 1 - \frac{2 \ln x}{x}, x > 0$

យើងបាន  $f'(x) = -2 \cdot \frac{(\ln x)'x - (x)' \ln x}{x^2} = -2 \cdot \frac{1 - \ln x}{x^2}$

ដូចនេះ  $f'(x) = \frac{2(\ln x - 1)}{x^2}$  ។

ចំពោះគ្រប់  $x > 0$  គេបាន  $f'(x) = \frac{2(\ln x - 1)}{x^2}$

មានសញ្ញាដូចភាគយក  $\ln x - 1$  ។

-បើ  $f'(x) > 0$  គេបាន  $\ln x - 1 > 0$  ឬ  $x > e$

-បើ  $f'(x) = 0$  គេបាន  $\ln x - 1 = 0$  ឬ  $x = e$


-បើ  $f'(x) < 0$  គេបាន  $\ln x - 1 < 0$  ឬ  $x < e$

ចំពោះ  $x = e$  គេបាន  $f(e) = 1 - \frac{2 \ln e}{e} = 1 - \frac{2}{e} = 1 - (0.7) = 0.3$  ។

## លំហាត់សិក្សាអនុគមន៍ច្រើនរើសពិសេស

$x$	$0$	$e$	$+\infty$
$y'$		-	+
$y$	$+\infty$	0.3	1

៣-សង់ក្រាប  $C$  នៅក្នុងតម្រុយកូអរដោនេមួយ ៖



៤-គណនាផ្ទៃក្រឡាផ្ទៃកប្បង់កំណត់ដោយក្រាប  $C$  អាស៊ីមតូតដេក បន្ទាត់ឈរ  $x=1$  និង  $x=e$  ។ តាង  $S$  ផ្ទៃក្រឡាផ្ទៃកប្បង់ ដែលត្រូវរក

ដោយ  $\forall x \in [1, e]$  ក្រាប  $C$  ស្ថិតនៅក្រោម  $y = 1$

$$\begin{aligned}
 \text{យើងបាន } S &= \int_1^e \left[ 1 - \left( 1 - \frac{2 \ln x}{x} \right) \right] \cdot dx \\
 &= \int_1^e \frac{2 \ln x}{x} \cdot dx = \int_1^e 2 \ln x \cdot \frac{dx}{x}
 \end{aligned}$$

តាង  $u = \ln x$  នោះ  $du = \frac{dx}{x}$

ចំពោះ  $x=1$  នោះ  $u=0$  ហើយ  $x=e$  នោះ  $u=1$

គេបាន  $S = \int_0^1 2u \cdot du = [u^2]_0^1 = 1^2 - 0^2 = 1$

ដូចនេះ  $S=1$  ( ឯកតាផ្ទៃក្រឡា ) ។

**លំហាត់ទី១២**

គេឲ្យអនុគមន៍  $f$  កំណត់លើ  $\mathbb{R}$  ដោយ  $f(x) = x - 4 + \frac{8}{e^x + 2}$

តាង  $(C)$  ជាក្រាបតាងអនុគមន៍  $f$  ក្នុងតម្រុយអរតូនរម៉ាល់  $(o, \vec{i}, \vec{j})$  ។

១) ក. រកលីមីត  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$  និង  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  ។

ខ. ស្រាយថាអនុគមន៍  $f$  អាចសរសេរជា  $f(x) = x - \frac{4e^x}{e^x + 2}$  គ្រប់  $x \in \mathbb{R}$  ។

គ. ទាញរកសមីការអាស៊ីមតូតទ្រេតពីរបស់ខ្សែកោង  $(C)$  ។

២) ក. ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា  $\forall x \in \mathbb{R} : f'(x) = \left( \frac{e^x - 2}{e^x + 2} \right)^2$  ។

ខ. សង់តារាងអថេរភាពនៃអនុគមន៍  $f$  ។

៣) រកសមីការបន្ទាត់  $(T)$  ដែលប៉ះនឹងខ្សែកោង  $(C)$  ត្រង់  $x = \ln 2$  ។

៤) គណនា  $f(-2)$  និង  $f(2)$  រួចសង់ក្រាប  $(C)$  និងបន្ទាត់  $(T)$  និងអាស៊ីមតូត

តូតទាំងអស់របស់ក្រាប  $(C)$  ក្នុងតម្រុយអរតូនរម៉ាល់  $(o, \vec{i}, \vec{j})$  តែមួយ ។

**ដំណោះស្រាយ**

១) ក. រកលីមីត  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$  និង  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

មាន  $f(x) = x - 4 + \frac{8}{e^x + 2}$

យើងបាន  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left( x - 4 + \frac{8}{e^x + 2} \right) = -\infty$  ។

និង  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( x - 4 + \frac{8}{e^x + 2} \right) = +\infty$  ។

ខ.ស្រាយថាអនុគមន៍  $f$  អាចសរសេរជា  $f(x) = x - \frac{4e^x}{e^x + 2}$  គ្រប់  $x \in \mathbb{R}$

យើងមាន  $f(x) = x - 4 + \frac{8}{e^x + 2} = x + \left( \frac{8}{e^x + 2} - 4 \right) = x - \frac{4e^x}{e^x + 2}$  ពិត

ដូចនេះ  $f(x) = x - \frac{4e^x}{e^x + 2}$  គ្រប់  $x \in \mathbb{R}$  ។

គ.ទាញរកសមីការអាស៊ីមតូតទ្រេតពីរបស់ខ្សែកោង  $(C)$

យើងមាន  $f(x) = x - 4 + \frac{8}{e^x + 2}$  និង  $f(x) = x - \frac{4e^x}{e^x + 2}$  គ្រប់  $x \in \mathbb{R}$  ។

ដោយ  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{8}{e^x + 2} = 0$  និង  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4e^x}{e^x + 2} = 0$

ដូចនេះ  $(d_1): y = x - 4$  និង  $(d_2): y = x$  ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃ  $(C)$  ។

២) ក.ស្រាយបញ្ជាក់ថា  $\forall x \in \mathbb{R}: f'(x) = \left( \frac{e^x - 2}{e^x + 2} \right)^2$

យើងមាន  $f(x) = x - 4 + \frac{8}{e^x + 2}$

យើងបាន  $f'(x) = 1 - \frac{8e^x}{(e^x + 2)^2} = \frac{(e^x + 2)^2 - 8e^x}{(e^x + 2)^2} = \frac{(e^x - 2)^2}{(e^x + 2)^2}$

ដូចនេះ  $f'(x) = \left( \frac{e^x - 2}{e^x + 2} \right)^2$  ។

ខ.សង់តារាងអថេរភាពនៃអនុគមន៍  $f$

យើងមាន  $f'(x) = \left( \frac{e^x - 2}{e^x + 2} \right)^2 \geq 0$  ចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត  $x$  នោះ  $f$

ជាអនុគមន៍កើនហើយបើ  $f'(x) = 0 \Leftrightarrow e^x - 2 = 0$  ឬ  $x = \ln 2$  ។

## លំហាត់សិក្សាអនុគមន៍ច្រើនរើសពិសេស

$x$	$-\infty$	$\ln 2$	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	+
$f(x)$	$-\infty$	-1.3	$+\infty$

ចំពោះ  $x = \ln 2$  នោះ  $f(\ln 2) = -2 + \ln 2 = -1.3$  ។

៣) រកសមីការបន្ទាត់ ( $T$ ) ដែលប៉ះនឹងខ្សែកោង ( $C$ ) ត្រង់  $x = \ln 2$


គេមាន  $f'(x) = \left( \frac{e^x - 2}{e^x + 2} \right)^2$  នោះ  $f'(\ln 2) = 0$

ដូចនេះសមីការបន្ទាត់ប៉ះ ( $T$ ) គឺ ( $T$ ):  $y = -2 + \ln 2$  ។

៤) គណនា  $f(-2)$  និង  $f(2)$

$f(-2) = -2 - 4 + \frac{8}{e^{-2} + 2} = -2.4$  និង  $f(2) = 2 - 4 + \frac{8}{e^2 + 2} = -1.1$  ។

សង់ក្រាប ( $C$ ) និងបន្ទាត់ ( $T$ ) និងអាស៊ីមតតូតទាំងអស់របស់ក្រាប ( $C$ )



**លំហាត់ទី១៣**

គេឲ្យអនុគមន៍  $f$  កំណត់លើ  $(0, +\infty)$  ដោយ

$$f(x) = -1 + 2\ln x + \frac{1 - 2\ln x}{2x^2} = 0$$

(C) ជាក្រាបតំណាងអនុគមន៍  $f$  ក្នុងតម្រុយអរតូនរម៉ាល់  $(o, \vec{i}, \vec{j})$  ។

១) ចូរគណនា  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  និង  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$  រួចបញ្ជាក់សមីការអាស៊ីមតូត ឈរនៃ (C) ។

២) ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា  $f'(x) = \frac{2(x^2 - 1 + \ln x)}{x^3}$  ចំពោះគ្រប់  $x > 0$  ។

៣) គេតាង  $g$  ជាអនុគមន៍កំណត់លើ  $(0, +\infty)$  ដោយ  $g(x) = x^2 - 1 + \ln x$  ។

a. គណនាដេរីវេ  $g'(x)$  រួចទាញថា  $g$  ជាអនុគមន៍កើនជានិច្ចលើ  $(0, +\infty)$  ។

b. គណនាតម្លៃ  $g(1)$  រួចសិក្សាសញ្ញានៃ  $g$  លើចន្លោះ  $(0, 1)$  និង  $(1, +\infty)$  ។

៤) ចូរគណនា  $f(1)$  រួចសង់តារាងអថេរភាពនៃ  $f$  ។

៥) ដោះស្រាយសមីការ  $f(x) = 0$  ។ គណនា  $f(2)$  រួចសង់ក្រាប (C) ។

(គេយក  $\frac{\sqrt{2}}{2} = 0.7, \sqrt{e} = 1.6, e = 2.7$  និង  $\ln 2 = 0.7$ )

**ដំណោះស្រាយ**

១) គណនា  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  និង  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$  រួចបញ្ជាក់អាស៊ីមតូតឈរនៃ (C)

យើងមាន  $f(x) = -1 + 2\ln x + \frac{1 - 2\ln x}{2x^2}$  គ្រប់  $x > 0$  ។

យើងបាន  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( -1 + 2\ln x + \frac{1 - 2\ln x}{2x^2} \right) = +\infty$

ព្រោះ  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$  និង  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - 2\ln x}{x^2} = 0$

ហើយ  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left( -1 + 2\ln x + \frac{1 - 2\ln x}{2x^2} \right)$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left[ -(1 - 2 \ln x) + \frac{(1 - 2 \ln x)}{2x^2} \right]$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left[ (1 - 2 \ln x) \left( -1 + \frac{1}{2x^2} \right) \right] = +\infty$$

ព្រោះ:  $\lim_{x \rightarrow 0^+} (1 - 2 \ln x) = +\infty$  និង  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left( -1 + \frac{1}{2x^2} \right) = +\infty$  ។

ដូចនេះ:  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$  និង  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$  ។

២) ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា  $f'(x) = \frac{2(x^2 - 1 + \ln x)}{x^3}$  ចំពោះគ្រប់  $x > 0$

យើងមាន  $f(x) = -1 + 2 \ln x + \frac{1 - 2 \ln x}{2x^2}$  គ្រប់  $x > 0$  ។

$$\text{យើងបាន } f'(x) = \frac{2}{x} + \frac{-2x - 2x(1 - 2 \ln x)}{2x^4} = \frac{2}{x} + \frac{-4x + 4x \ln x}{2x^4}$$

$$= \frac{2}{x} - \frac{2 - 2 \ln x}{x^3} = \frac{2x^2 - 2 + 2 \ln x}{x^3}$$

ដូចនេះ:  $f'(x) = \frac{2(x^2 - 1 + \ln x)}{x^3}$  ពិត។

៣) a. គណនាដេរីវេ  $g'(x)$  រួចទាញថា  $g$  ជាអនុគមន៍កើនជានិច្ចលើ  $(0, +\infty)$

យើងមាន  $g(x) = x^2 - 1 + \ln x$

$$\text{យើងបាន } g'(x) = 2x + \frac{1}{x} = \frac{2x^2 + 1}{x} \quad \forall$$

ដោយគ្រប់  $x > 0$  គេមាន  $\frac{2x^2 + 1}{x} > 0$  នោះ:  $g'(x) > 0$  ។

ដូចនេះ:  $g$  ជាអនុគមន៍កើនជានិច្ចលើ  $(0, +\infty)$  ។

b. គណនាតម្លៃ  $g(1)$  រួចសិក្សាសញ្ញានៃ  $g$  លើចន្លោះ  $(0, 1)$  និង  $(1, +\infty)$

ចំពោះ  $x = 1$  យើងបាន  $g(1) = 1^2 - 1 + \ln 1 = 1 - 1 + 0 = 0$

ដូចនេះ:  $g(1) = 0$  ។

ម្យ៉ាងទៀតដោយ  $g$  ជាអនុគមន៍កើនជានិច្ចលើ  $(0, +\infty)$  នោះយើងទាញបាន៖

## លំហាត់សិក្សាអនុគមន៍ច្រើនអ៊ែសពិសេស

ចំពោះ  $x \in (0,1)$ :  $g(x) < 0$  និង  $x \in (1,+\infty)$ :  $g(x) > 0$  ។

៤) គណនា  $f(1)$  រួចសង់តារាងអថេរភាពនៃ  $f$

យើងមាន  $f(x) = -1 + 2\ln x + \frac{1-2\ln x}{2x^2}$  គ្រប់  $x > 0$

ចំពោះ  $x=1$  នោះ  $f(1) = -1 + 2\ln 1 + \frac{1-2\ln 1}{2(1)^2} = -1 + 0 + \frac{1-0}{2} = -\frac{1}{2}$

ដូចនេះ  $f(1) = -\frac{1}{2}$  ។

ម្យ៉ាងទៀតដោយ  $f'(x) = \frac{2(x^2 - 1 + \ln x)}{x^3} = \frac{2g(x)}{x^3}$  មានសញ្ញាដូច  $g(x)$  ។

យោងតាមសម្រាយខាងលើយើងបាន  $f'(x) < 0$  ចំពោះ  $x \in (0,1)$

ហើយ  $f'(x) = 0$  ចំពោះ  $x=1$  និង  $f'(x) > 0$  ចំពោះ  $x \in (1,+\infty)$  ។

តារាងអថេរភាពនៃ  $f$ :

$x$	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	$+\infty$	$-\frac{1}{2}$	$+\infty$

៥) ដោះស្រាយសមីការ  $f(x) = 0$  និង គណនា  $f(2)$  រួចសង់ក្រាប(C)

យើងមាន  $f(x) = -1 + 2\ln x + \frac{1-2\ln x}{2x^2} = 0$  ដែល  $x > 0$

$$\text{សមមូល } -(1-2\ln x) + \frac{(1-2\ln x)}{2x^2} = 0$$

$$\text{សមមូល } (1-2\ln x) \left( -1 + \frac{1}{2x^2} \right) = 0$$

$$\text{សមមូល } \frac{(1-2\ln x)(-2x^2+1)}{2x^2} = 0$$




## លំហាត់សិក្សាអនុគមន៍ច្រើនអិសពិសេស

សមមូល  $\begin{cases} \ln x = \frac{1}{2} \\ x^2 = \frac{1}{2} \end{cases}$  ឬ  $\begin{cases} x = \sqrt{e} \\ x = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$

ដូចនេះសមីការមានឫពីរគឺ  $x = \sqrt{e}$  ,  $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$  ។

ម្យ៉ាងទៀតចំពោះ  $x = 2$  នោះ  $f(2) = \frac{(1-2\ln 2)(-8+1)}{8} = \frac{(1-1.4)(-7)}{8} = 0.35$

ដូចនេះ  $f(2) = 0.35$  ។



**លំហាត់ទី១៤**

គេឲ្យអនុគមន៍  $f$  កំណត់លើ  $(0, +\infty)$  ដោយ  $f(x) = 1 - \ln x + \frac{\ln x}{x^2}$

មានក្រាប  $(C)$  ។

១) គណនាលីមីត  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  និង  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$  រួចទាញបញ្ជាក់សមីការនៃអាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាប  $(C)$  ។

២) ចូរស្រាយថាចំពោះគ្រប់  $x > 0$  គេបាន  $f'(x) = \frac{-x^2 + 1 - 2\ln x}{x^3}$  ។

៣) គេតាំង  $g(x) = -x^2 + 1 - 2\ln x$  ចំពោះគ្រប់  $x > 0$  ។

ក) ចូរស្រាយថា  $g'(x) < 0$  ជានិច្ចចំពោះគ្រប់  $x > 0$  ។

ខ) គណនា  $g(1)$  ។

ចូរសិក្សាសញ្ញានៃ  $g(x)$  ចំពោះ  $x \in (0, 1)$  និង  $x \in (1, +\infty)$  ។

៤) ដោយប្រើលទ្ធផលសំណួរទី៣ ចូរទាញបញ្ជាក់សញ្ញានៃ  $f'(x)$  លើចន្លោះ  $(0, +\infty)$  រួចគូសតារាងអថេរភាពនៃអនុគមន៍  $f$  ។

៥) គណនាតម្លៃ  $f\left(\frac{1}{2}\right)$ ,  $f(2)$  និង  $f(4)$  ។

ចូរសង់ក្រាប  $(C)$  ក្នុងតម្រុយអេតូនរម៉ាល់  $(o, i, j)$  ។

គេឲ្យ  $\ln 2 = 0.7$  ។

**ដំណោះស្រាយ**

១) រក  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  និង  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$  រួចទាញបញ្ជាក់អាស៊ីមតូតឈរនៃ  $(C)$

យើងបាន  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( 1 - \ln x + \frac{\ln x}{x^2} \right) = -\infty$  ព្រោះ  $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^2} = 0 \end{cases}$

និង  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left( 1 - \ln x + \frac{\ln x}{x^2} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left[ 1 + \left( -1 + \frac{1}{x^2} \right) \ln x \right] = -\infty$

**លំហាត់សិក្សាអនុគមន៍ច្រើនអ៊ែសពិសេស**

---

ព្រោះ  $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\ln x) = -\infty$  ,  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^2} = +\infty$  ។

ដោយ  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$  នោះបន្ទាត់  $x = 0$  ជាអាស៊ីមតូតឈរនៃ (C) ។

២) ស្រាយថាចំពោះគ្រប់  $x > 0$  គេបាន  $f'(x) = \frac{-x^2 + 1 - 2\ln x}{x^3}$

យើងមាន  $f(x) = 1 - \ln x + \frac{\ln x}{x^2}$

យើងបាន  $f'(x) = -\frac{1}{x} + \frac{x - 2x \ln x}{x^4} = \frac{-x^2 + 1 - 2\ln x}{x^3}$  ពិត

ដូចនេះ  $f'(x) = \frac{-x^2 + 1 - 2\ln x}{x^3}$  ។

៣) គេតាង  $g(x) = -x^2 + 1 - 2\ln x$  ចំពោះគ្រប់  $x > 0$  ។

ក) ស្រាយថា  $g'(x) < 0$  ជានិច្ចចំពោះគ្រប់  $x > 0$

យើងបាន  $g'(x) = -2x - \frac{2}{x} = -\frac{2(x^2 + 1)}{x} < 0$  ព្រោះ  $\forall x > 0: \frac{x^2 + 1}{x} > 0$

ដូចនេះ  $g'(x) < 0$  ជានិច្ចចំពោះគ្រប់  $x > 0$  ។

ខ) គណនា  $g(1)$

យើងបាន  $g(1) = -1 + 1 - 2\ln 1 = 0$  ។

សិក្សាសញ្ញានៃ  $g(x)$  ចំពោះ  $x \in (0,1)$  និង  $x \in (1,+\infty)$  ៖

ដោយ  $g'(x) < 0$  ជានិច្ចចំពោះគ្រប់  $x > 0$  នោះ  $g$  ជាអនុគមន៍ចុះជានិច្ច

លើ  $(1,+\infty)$  យើងបាន  $g(x) > 0$  ចំពោះ  $x \in (0,1)$  និង  $g(x) < 0$

ចំពោះ  $x \in (1,+\infty)$  ។

៤) ដោយប្រើលទ្ធផលសំណួរទី៣បញ្ជាក់សញ្ញានៃ  $f'(x)$  លើចន្លោះ  $(0,+\infty)$

ដោយ  $f'(x) = \frac{-x^2 + 1 - 2\ln x}{x^3} = \frac{g(x)}{x^3}$  មានសញ្ញាដូច  $g$  លើចន្លោះ  $(0,+\infty)$

តាមសម្រាយខាងលើយើងបាន ៖

$f(x) > 0$  ចំពោះ  $x \in (0,1)$  និង  $f(x) < 0$  ចំពោះ  $x \in (1,+\infty)$  ។

## លំហាត់សិក្សាអនុគមន៍ច្រើនអិសពិសេស

គូសតារាងអថេរភាពនៃអនុគមន៍  $f$  ៖

$x$	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	$-\infty$	1	$-\infty$

៥) គណនាតម្លៃ  $f\left(\frac{1}{2}\right)$ ,  $f(2)$  និង  $f(4)$

ដោយ  $f(x) = 1 - \ln x + \frac{\ln x}{x^2}$


យើងបាន  $f\left(\frac{1}{2}\right) = 1 - \ln \frac{1}{2} + 4 \ln \frac{1}{2} = 1 - 3 \ln 2 = 1 - 3(0.7) = -1.1$

$$f(2) = 1 - \ln 2 + \frac{\ln 2}{4} = 1 - 0.7 + \frac{0.7}{4} = 0.475$$

$$f(4) = 1 - \ln 4 + \frac{\ln 4}{16} = 1 - 2 \ln 2 + \frac{\ln 2}{8} = -0.3125$$

ដូចនេះ  $f\left(\frac{1}{2}\right) = -1.1$ ,  $f(2) = 0.475$ ,  $f(4) = -0.3125$  ។

សង់ក្រាប(C) ក្នុងតម្រុយអេតូនរម៉ាល់  $(o, \vec{i}, \vec{j})$  ៖



**លំហាត់ទី១៥**

គេឲ្យអនុគមន៍  $f$  កំណត់លើ  $(0, +\infty)$  ដោយ  $f(x) = x^3 - 6x + 3x \ln x + 3$  មានក្រាប  $(C)$  ។

១) គណនាលីមីត  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  និង  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$  ។

២) ចូរស្រាយថាចំពោះគ្រប់  $x > 0$  គេបាន  $f'(x) = 3(x^2 - 1 + \ln x)$  ។

៣) គេតាង  $g(x) = x^2 - 1 + \ln x$  ចំពោះគ្រប់  $x > 0$  ។

ក) ចូរស្រាយថា  $g'(x) > 0$  ជានិច្ចចំពោះគ្រប់  $x > 0$  ។

ខ) គណនា  $g(1)$  ។

ចូរសិក្សាសញ្ញានៃ  $g(x)$  ចំពោះ  $x \in (0, 1)$  និង  $x \in (1, +\infty)$  ។

៤) ដោយប្រើលទ្ធផលសំណួរទី៣ ចូរទាញបញ្ជាក់សញ្ញានៃ  $f'(x)$  លើចន្លោះ  $(0, +\infty)$  រួចគូសតារាងអថេរភាពនៃអនុគមន៍  $f$  ។

៥) គណនាតម្លៃ  $f(2)$  ។ ចូរសង់ក្រាប  $(C)$  ក្នុងតម្រុយអេតូនម៉ាល់  $(o, \vec{i}, \vec{j})$  ។  
គេឲ្យ  $\ln 2 = 0.7$  ។

**ដំណោះស្រាយ**

១) គណនាលីមីត  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  និង  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$

អនុគមន៍  $f$  កំណត់លើ  $(0, +\infty)$  ដោយ  $f(x) = x^3 - 6x + 3x \ln x + 3$

$$\begin{aligned} \text{យើងបាន } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} (x^3 - 6x + 3x \ln x + 3) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[ x^3 \left( 1 - \frac{6}{x} + 3 \frac{\ln x}{x^2} + \frac{3}{x^3} \right) \right] = +\infty \end{aligned}$$

$$\text{ព្រោះ } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^2} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{6}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{x^3} = 0 \quad \text{។}$$

$$\text{ហើយ } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x^3 - 6x + 3x \ln x + 3) = 3 \quad \text{ព្រោះ } \lim_{x \rightarrow 0^+} (x \ln x) = 0$$

២) ស្រាយថាចំពោះគ្រប់  $x > 0$  គេបាន  $f'(x) = 3(x^2 - 1 + \ln x)$

## លំហាត់សិក្សាអនុគមន៍ច្រើនអិលពិសេស

យើងមាន  $f(x) = x^3 - 6x + 3x \ln x + 3$

យើងបាន  $f'(x) = 3x^2 - 6 + 3 \ln x + 3 = 3x^2 - 3 + 3 \ln x$

ដូចនេះចំពោះគ្រប់  $x > 0$  គេបាន  $f'(x) = 3(x^2 - 1 + \ln x)$  ពិតៗ

៣) គេតាង  $g(x) = x^2 - 1 + \ln x$  ចំពោះគ្រប់  $x > 0$  ។

ក) ស្រាយថា  $g'(x) > 0$  ជានិច្ចចំពោះគ្រប់  $x > 0$

យើងមាន  $g'(x) = 2x + \frac{1}{x} = \frac{2x^2 + 1}{x} > 0$  ចំពោះគ្រប់  $x > 0$

ដូចនេះស្រាយថា  $g'(x) > 0$  ជានិច្ចចំពោះគ្រប់  $x > 0$  ។

ខ) គណនា  $g(1)$

យើងបាន  $g(1) = 1^2 - 1 + \ln 1 = 1 - 1 + 0 = 0$  ។ ដូចនេះ  $g(1) = 0$  ។

សិក្សាសញ្ញានៃ  $g(x)$  ចំពោះ  $x \in (0, 1)$  និង  $x \in (1, +\infty)$

ដោយ  $g'(x) > 0$  ជានិច្ចចំពោះគ្រប់  $x > 0$  នោះ  $g$  ជាអនុគមន៍កើនលើ  $(0, +\infty)$

ហើយដោយយើងមាន  $g(1) = 0$  នោះយើងអាចសន្និដ្ឋានសញ្ញានៃ  $g$  ដូចតទៅ

ចំពោះ  $x \in (0, 1)$  នោះ  $g(x) < 0$  និងចំពោះ  $x \in (1, +\infty)$  នោះ  $g(x) > 0$  ។

៤) ទាញបញ្ជាក់សញ្ញានៃ  $f'(x)$  លើចន្លោះ  $(0, +\infty)$

យើងមាន  $f'(x) = 3(x^2 - 1 + \ln x) = 3g(x)$

នោះ  $f(x)$  មានសញ្ញាដូច  $g(x)$  ។

យោងតាមសម្រាយខាងលើយើងបាន  $f'(x) < 0$  ចំពោះ  $x \in (0, 1)$

ហើយ  $f'(x) = 0$  ចំពោះ  $x = 1$  និង  $f'(x) > 0$  ចំពោះ  $x \in (1, +\infty)$  ។


តារាងអថេរភាពនៃ  $f$  :

$x$	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	$+\infty$	$-2$	$+\infty$

## លំហាត់សិក្សាអនុគមន៍ជ្រើសរើសពិសេស

៥) គណនាតម្លៃ  $f(2)$  រួចសង់ក្រាប  $(C)$  ក្នុងតម្រុយអេតូនរម៉ាល់  $(o, \vec{i}, \vec{j})$

ចំពោះ  $x = 2$  នោះ  $f(2) = 8 - 12 + 6 \ln 2 + 3 = 3.2$



### លំហាត់ទី១៦

គេឲ្យអនុគមន៍  $f$  កំណត់លើ  $(0, +\infty)$  ដោយ  $f(x) = 2(x-2) + \frac{1-\ln x}{x}$

មានក្រាប  $(C)$  ។

១) គណនាលីមីត  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  និង  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$  រួចបញ្ជាក់អាស៊ីមតូតឈរ។

២) ស្រាយថាបន្ទាត់  $(\Delta): y = 2x - 4$  ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប  $(C)$

បើ  $x \rightarrow +\infty$  ។ សិក្សាទីតាំងធៀបរវាងបន្ទាត់  $(\Delta)$  ជាមួយខ្សែកោង  $(C)$  ។

៣) ចូរស្រាយថាចំពោះគ្រប់  $x > 0$  គេបាន  $f'(x) = \frac{2(x^2 - 1) + \ln x}{x^2}$  ។

៤) គេតាំង  $g(x) = 2(x^2 - 1) + \ln x$  ចំពោះគ្រប់  $x > 0$  ។

ក) ចូរស្រាយថា  $g'(x) > 0$  ជានិច្ចចំពោះគ្រប់  $x > 0$  ។

ខ) គណនា  $g(1)$  ។

ចូរសិក្សាសញ្ញានៃ  $g(x)$  ចំពោះ  $x \in (0, 1)$  និង  $x \in (1, +\infty)$  ។

៥) ដោយប្រើលទ្ធផលសំណួរទី៣ចូរទាញបញ្ជាក់សញ្ញានៃ  $f'(x)$  លើចន្លោះ  $(0, +\infty)$  រួចគូសតារាងអថេរភាពនៃអនុគមន៍  $f$  ។

៦) គណនាតម្លៃ  $f(\frac{1}{e})$  និង  $f(2)$  រួចទាញបញ្ជាក់សមីការ  $f(x) = 0$

មានឫសពីរ  $\alpha$  និង  $\beta$  ដែល  $\frac{1}{e} < \alpha < 1 < \beta < 2$  ។

ចូរសង់ក្រាប  $(C)$  ក្នុងតម្រុយអេតូនរម៉ាល់  $(o, \vec{i}, \vec{j})$  ។

គេឲ្យ  $\ln 2 = 0.7, e^{-1} = 0.4$  ។

**ដំណោះស្រាយ**

១) គណនាលីមីត  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  និង  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$  រួចបញ្ជាក់អាស៊ីមតូតឈរ

យើងបាន  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \left[ 2(x-2) + \frac{1-\ln x}{x} \right] = +\infty$  ព្រោះ  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1-\ln x}{x} = 0$  ។

និង  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left[ 2(x-2) + \frac{1-\ln x}{x} \right] = +\infty$  ព្រោះ  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1-\ln x}{x} = +\infty$  ។

ដូចនេះបន្ទាត់  $x = 0$  ជាអាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាប។

២) ស្រាយថា  $(\Delta): y = 2x - 4$  ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប  $(C)$  បើ  $x \rightarrow +\infty$

យើងបាន  $f(x) - y = \frac{1-\ln x}{x}$

ដោយ  $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - y] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1-\ln x}{x} = 0$

នោះបន្ទាត់  $(\Delta): y = 2x - 4$  ជាអាស៊ីមតូត

ទ្រេតនៃក្រាប  $(C)$  បើ  $x \rightarrow +\infty$  ។

សិក្សាទីតាំងធៀបរវាងបន្ទាត់  $(\Delta)$  ជាមួយខ្សែកោង  $(C)$  ៖

យើងមាន  $f(x) - y = \frac{1-\ln x}{x}$  មានសញ្ញាដូចភាគយក  $(1-\ln x)$  គ្រប់  $x > 0$

ចំពោះ  $1-\ln x = 0 \Leftrightarrow x = e$  នោះ  $f(x) - y = 0$  នាំឲ្យបន្ទាត់  $(\Delta)$  និងក្រាប  $(C)$

ប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុច  $A(e, 2e - 4)$  ។



ចំពោះ  $1 - \ln x < 0 \Leftrightarrow x > e$  នោះ  $f(x) - y < 0$

នាំឲ្យបន្ទាត់ ( $\Delta$ ) ស្ថិតនៅខាងលើ ( $C$ ) ។

ចំពោះ  $1 - \ln x > 0 \Leftrightarrow 0 < x < e$  នោះ  $f(x) - y > 0$

នាំឲ្យបន្ទាត់ ( $\Delta$ ) ស្ថិតនៅពីលើខ្សែកោង ( $C$ ) ។

៣) ស្រាយថាចំពោះគ្រប់  $x > 0$  គេបាន  $f'(x) = \frac{2(x^2 - 1) + \ln x}{x^2}$

យើងមាន  $f(x) = 2(x - 2) + \frac{1 - \ln x}{x}$

យើងបាន  $f'(x) = 2 + \frac{-1 - (1 - \ln x)}{x^2} = \frac{2x^2 - 2 + \ln x}{x^2} = \frac{2(x^2 - 1) + \ln x}{x^2}$

ដូចនេះចំពោះគ្រប់  $x > 0$  គេបាន  $f'(x) = \frac{2(x^2 - 1) + \ln x}{x^2}$  ។

៤) គេតាង  $g(x) = 2(x^2 - 1) + \ln x$  ចំពោះគ្រប់  $x > 0$  ។

ក) ស្រាយថា  $g'(x) > 0$  ជានិច្ចចំពោះគ្រប់  $x > 0$

យើងមាន  $g'(x) = 4x + \frac{1}{x} = \frac{4x^2 + 1}{x} > 0$  ចំពោះគ្រប់  $x > 0$

ដូចនេះស្រាយថា  $g'(x) > 0$  ជានិច្ចចំពោះគ្រប់  $x > 0$  ។

ខ) គណនា  $g(1)$  យើងបាន  $g(1) = 2(1^2 - 1) + \ln 1 = 2(1 - 1) + 0 = 0$

ដូចនេះ  $g(1) = 0$  ។

សិក្សាសញ្ញានៃ  $g(x)$  ចំពោះ  $x \in (0, 1)$  និង  $x \in (1, +\infty)$

ដោយ  $g'(x) > 0$  ជានិច្ចចំពោះគ្រប់  $x > 0$  នោះ  $g$  ជាអនុគមន៍កើន

លើ  $(0, +\infty)$  ហើយដោយយើងមាន  $g(1) = 0$  នោះយើងអាចសន្និដ្ឋានសញ្ញានៃ  $g$  ដូចតទៅ៖

ចំពោះ  $x \in (0, 1)$  នោះ  $g(x) < 0$  និងចំពោះ  $x \in (1, +\infty)$  នោះ  $g(x) > 0$  ។

៥) ដោយប្រើលទ្ធផលសំណួរទី៣បញ្ជាក់សញ្ញានៃ  $f'(x)$  លើចន្លោះ  $(0, +\infty)$

រួចគូសតារាងអថេរភាពនៃអនុគមន៍  $f$  ។

## លំហាត់សិក្សាអនុគមន៍ច្រើនអ៊ែសពិសេស

យើងមាន  $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$  នោះ  $f(x)$  មានសញ្ញាដូច  $g(x)$  ។

យោងតាមសម្រាយខាងលើយើងបាន  $f'(x) < 0$  ចំពោះ  $x \in (0,1)$

ហើយ  $f'(x) = 0$  ចំពោះ  $x = 1$  និង  $f'(x) > 0$  ចំពោះ  $x \in (1, +\infty)$  ។

តារាងអថេរភាពនៃ  $f$  :

$x$	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	$+\infty$	-1	$+\infty$

៦) គណនាតម្លៃ  $f\left(\frac{1}{e}\right)$  និង  $f(2)$

យើងបាន  $f\left(\frac{1}{e}\right) = f(e^{-1}) = 2(e^{-1} - 2) + \frac{1 - \ln e^{-1}}{e^{-1}} = 2(0.4 - 2) + \frac{2}{0.4} = 1.8$

ហើយ  $f(2) = 0 + \frac{1 - \ln 2}{2} = \frac{1 - 0.7}{2} = 0.15$  ។

ដូចនេះ  $f\left(\frac{1}{e}\right) = 1.8$  និង  $f(2) = 0.15$  ។

ទាញបញ្ជាក់សមីការ  $f(x) = 0$  មានឫសពីរ  $\alpha$  និង  $\beta$  ដែល  $\frac{1}{e} < \alpha < 1 < \beta < 2$

យើងមាន  $f(1) = 2(1 - 2) + \frac{1 - \ln 1}{1} = -1$  ។


ដោយ  $f\left(\frac{1}{e}\right)f(1) = -1.8 < 0$  និង  $f(1)f(2) = -0.15 < 0$

តាមទ្រឹស្តីបទតម្លៃកណ្តាលមានពីរចំនួនពិត  $\alpha$  និង  $\beta$  ដែល  $\frac{1}{e} < \alpha < 1 < \beta < 2$

ធ្វើឲ្យកន្សោម  $f(x) = 0$  មានន័យថាសមីការ  $f(x) = 0$  មានឫសពីរ  $\alpha$  និង  $\beta$

ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់  $\frac{1}{e} < \alpha < 1 < \beta < 2$  ។

សង់ក្រាប(C) ក្នុងតម្រុយអេតូនរម៉ាល់  $(o, \vec{i}, \vec{j})$



**លំហាត់ទី១៧**

គេឲ្យអនុគមន៍  $f$  កំណត់លើ  $(0, +\infty)$  ដោយ  $f(x) = -2x + 3 - \frac{1 - \ln x}{x}$

មានក្រាប(C) ។

១) គណនាលីមីត  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  និង  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$  រួចបញ្ជាក់សមីការ

អាស៊ីមតូតឈរ។

២) ស្រាយថាបន្ទាត់( $\Delta$ ):  $y = -2x + 3$  ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប(C)

បើ  $x \rightarrow +\infty$  ។ ចូរសិក្សាទីតាំងធៀបរវាងបន្ទាត់( $\Delta$ ) ជាមួយខ្សែកោង(C) ។

៣) ចូរស្រាយថាចំពោះគ្រប់  $x > 0$  គេបាន  $f'(x) = \frac{2(1 - x^2) - \ln x}{x^2}$  ។

៤) គេតាង  $g(x) = 2(1-x^2) - \ln x$  ចំពោះគ្រប់  $x > 0$  ។

ក) ចូរស្រាយថា  $g'(x) < 0$  ជានិច្ចចំពោះគ្រប់  $x > 0$  ។

ខ) គណនា  $g(1)$  ។

ចូរសិក្សាសញ្ញានៃ  $g(x)$  ចំពោះ  $x \in (0,1)$  និង  $x \in (1,+\infty)$  ។

៥) ដោយប្រើលទ្ធផលសំណួរទី៣ចូរទាញរកសញ្ញានៃ  $f'(x)$  លើចន្លោះ  $(0,+\infty)$

រួចគូសតារាងអថេរភាពនៃអនុគមន៍  $f$  ។

៦) ចូរសង់ក្រាប  $(C)$  ក្នុងតម្រុយអេតូនរម៉ាល់  $(o, \vec{i}, \vec{j})$  ។

គេឲ្យ  $\ln 2 = 0.7, e^{-1} = 0.4$

**ដំណោះស្រាយ**

-១) គណនាលីមីត  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  និង  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$  រួចបញ្ជាក់អាស៊ីមតូតឈរ

យើងបាន  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \left[ -2x + 3 - \frac{1 - \ln x}{x} \right] = -\infty$  ព្រោះ  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - \ln x}{x} = 0$  ។

និង  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left[ -2x + 3 - \frac{1 - \ln x}{x} \right] = -\infty$  ព្រោះ  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \ln x}{x} = +\infty$  ។

ដូចនេះបន្ទាត់  $x = 0$  ជាអាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាប។

២) ស្រាយថាបន្ទាត់  $(\Delta): y = -2x + 3$  ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប  $(C)$

យើងបាន  $f(x) - y = -\frac{1 - \ln x}{x}$

ដោយ  $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - y] = -\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - \ln x}{x} = 0$

នោះបន្ទាត់  $(\Delta): y = -2x + 3$  ជាអាស៊ីមតូត

តូតទ្រេតនៃក្រាប  $(C)$  បើ  $x \rightarrow +\infty$  ។

សិក្សាទីតាំងធៀបរវាងបន្ទាត់  $(\Delta)$  ជាមួយខ្សែកោង  $(C)$  ៖

យើងមាន  $f(x) - y = -\frac{1 - \ln x}{x}$  មានសញ្ញាដូចភាគយក  $(\ln x - 1)$  គ្រប់  $x > 0$

ចំពោះ  $\ln x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = e$  នោះ  $f(x) - y = 0$  នាំឲ្យបន្ទាត់  $(\Delta)$  និងក្រាប  $(C)$

ប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុច  $A(e, -2e+3)$  ។

ចំពោះ  $\ln x - 1 < 0 \Leftrightarrow 0 < x < e$  នោះ  $f(x) - y < 0$

នាំឲ្យបន្ទាត់( $\Delta$ )ស្ថិតនៅខាងលើ( $C$ ) ។

ចំពោះ  $\ln x - 1 > 0 \Leftrightarrow x > e$  នោះ  $f(x) - y > 0$  នាំឲ្យបន្ទាត់( $\Delta$ )ស្ថិតនៅពីលើខ្សែកោង ( $C$ )។

៣) ស្រាយថាចំពោះគ្រប់  $x > 0$  គេបាន  $f'(x) = \frac{2(1-x^2) - \ln x}{x^2}$

យើងមាន  $f(x) = -2x + 3 - \frac{1 - \ln x}{x}$

យើងបាន  $f'(x) = -2 - \frac{-1 - (1 - \ln x)}{x^2} = \frac{-2x^2 + 2 - \ln x}{x^2}$

ដូចនេះ  $f'(x) = \frac{2(1-x^2) - \ln x}{x^2}$  ។

៤) គេតាំង  $g(x) = 2(1-x^2) - \ln x$  ចំពោះគ្រប់  $x > 0$  ។

ក) ស្រាយថា  $g'(x) < 0$  ជានិច្ចចំពោះគ្រប់  $x > 0$

យើងមាន  $g'(x) = -2x - \frac{1}{x} = -\frac{2x^2 + 1}{x} < 0$  ចំពោះគ្រប់  $x > 0$

ដូចនេះស្រាយថា  $g'(x) < 0$  ជានិច្ចចំពោះគ្រប់  $x > 0$  ។

ខ) គណនា  $g(1)$  យើងបាន  $g(1) = 2(1-1) - \ln 1 = 2(1-1) + 0 = 0$

ដូចនេះ  $g(1) = 0$  ។

សិក្សាសញ្ញានៃ  $g(x)$  ចំពោះ  $x \in (0,1)$  និង  $x \in (1, +\infty)$

ដោយ  $g'(x) < 0$  ជានិច្ចចំពោះគ្រប់  $x > 0$  នោះ  $g$  ជាអនុគមន៍ចុះលើ  $(0, +\infty)$

ហើយដោយយើងមាន  $g(1) = 0$  នោះយើងអាចសន្និដ្ឋានសញ្ញានៃ  $g$

ដូចតទៅ៖

ចំពោះ  $x \in (0,1)$  នោះ  $g(x) > 0$  និងចំពោះ  $x \in (1, +\infty)$  នោះ  $g(x) < 0$  ។

## លំហាត់សិក្សាអនុគមន៍ច្រើនអ៊ែសពិសេស

៥) ដោយប្រើលទ្ធផលសំណួរទី៣បញ្ជាក់សញ្ញានៃ  $f'(x)$  លើចន្លោះ  $(0, +\infty)$


រួចគូសតារាងអថេរភាពនៃអនុគមន៍  $f$  ៖

យើងមាន  $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$  នោះ  $f(x)$  មានសញ្ញាដូច  $g(x)$  ។


យោងតាមសម្រាយខាងលើយើងបាន  $f'(x) > 0$  ចំពោះ  $x \in (0, 1)$

ហើយ  $f'(x) = 0$  ចំពោះ  $x = 1$  និង  $f'(x) < 0$  ចំពោះ  $x \in (1, +\infty)$  ។

តារាងអថេរភាពនៃ  $f$  ៖

$x$	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$			

៦) សង់ក្រាប  $(C)$  ក្នុងតម្រុយអេតូនរម៉ាល់  $(o, \vec{i}, \vec{j})$



**លំហាត់ទី១៨**

គេឲ្យ  $f$  ជាអនុគមន៍កំណត់លើ  $\mathbb{R}$  ដោយ  $f(x) = x + 2 - \frac{2(e^x - 1)}{e^x + 1}$

មានក្រាប  $(C)$  ។

១. ចូរគណនាលីមីត  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$  និង  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  រួចសិក្សាទីតាំងធៀប  
រវាងខ្សែកោង  $(C)$  ជាមួយនឹងបន្ទាត់  $(\Delta): y = x + 2$  ។

២. ក) ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា  $f'(x) = \left(\frac{e^x - 1}{e^x + 1}\right)^2$  ចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត  $x$  ។

ខ) គូសតារាងអថេរភាពនៃ  $f$  ។

៣. ក) ចំពោះគ្រប់  $x \in \mathbb{R}$  ចូរស្រាយបំភ្លឺថាកន្សោម  $f(x)$  អាចសរសេរ

ជាពីរទម្រង់  $f(x) = x + \frac{4}{e^x + 1}$  និង  $f(x) = x + 4 - \frac{4e^x}{e^x + 1}$  ។

ខ) ទាញបញ្ជាក់ថាខ្សែកោង  $(C)$  មានអាស៊ីមតូតទ្រេតពីរតាងដោយ  $(d_1)$  និង  $(d_2)$

៤. គណនា  $f(x) + f(-x)$  រួចទាញថាចំណុច  $I(0, 2)$  ជាផ្ចិតឆ្លុះនៃក្រាប  $(C)$  ។

៥. គណនា  $f(1)$  និង  $f(2)$  រួចសង់ក្រាប  $(C)$  បន្ទាត់  $(\Delta), (d_1), (d_2)$

នៅក្នុងតម្រុយអរតូនរម៉ាល់  $(o, \vec{i}, \vec{j})$  តែមួយ។

គេយក  $e = 2.7, \frac{e-1}{e+1} = 0.5$  និង  $\frac{e^2-1}{e^2+1} = 0.8$  ។

**ដំណោះស្រាយ**

១. គណនាលីមីត  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$  និង  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  រួចសិក្សាទីតាំងធៀប

រវាងខ្សែកោង  $(C)$  ជាមួយនឹងបន្ទាត់  $(\Delta): y = x + 2$  ៖

យើងមាន  $f(x) = x + 2 - \frac{2(e^x - 1)}{e^x + 1}$

យើងបាន  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[ x + 2 - \frac{2(e^x - 1)}{e^x + 1} \right] = -\infty$

និង  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[ x + 2 - \frac{2(e^x - 1)}{e^x + 1} \right] = +\infty$

ដូចនេះ  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$  និង  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$  ។

ម្យ៉ាងទៀត  $\begin{cases} (C): f(x) = x + 2 - \frac{2(e^x - 1)}{e^x + 1} \\ (\Delta): y = x + 2 \end{cases}$

យើងបាន  $(C) - (\Delta): f(x) - y = -\frac{2(e^x - 1)}{e^x + 1} = \frac{2(1 - e^x)}{e^x + 1}$

ដោយគ្រប់  $x \in \mathbb{R}: e^x + 1 > 0$  នោះ  $f(x) - y = \frac{2(1 - e^x)}{e^x + 1}$

បើ  $1 - e^x < 0 \Leftrightarrow x > 0$  នោះ  $(C)$  ស្ថិតនៅពីក្រោមបន្ទាត់  $(\Delta)$  ។

បើ  $1 - e^x = 0 \Leftrightarrow x = 0$  នោះ  $(C)$  ប្រសព្វបន្ទាត់  $(\Delta)$  ត្រង់ចំណុច  $I(0, 2)$  ។

បើ  $1 - e^x > 0 \Leftrightarrow x < 0$  នោះ  $(C)$  ស្ថិតនៅខាងលើបន្ទាត់  $(\Delta)$  ។

២.ក) ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា  $f'(x) = \left( \frac{e^x - 1}{e^x + 1} \right)^2$  ចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត  $x$

យើងមាន  $f(x) = x + 2 - \frac{2(e^x - 1)}{e^x + 1}$

យើងបាន  $f'(x) = 1 - \frac{2e^x(e^x + 1) - 2e^x(e^x - 1)}{(e^x + 1)^2} = \frac{(e^x + 1)^2 - 4e^x}{(e^x + 1)^2}$

$$f'(x) = \frac{e^{2x} + 2e^x + 1 - 4e^x}{(e^x + 1)^2} = \frac{(e^x - 1)^2}{(e^x + 1)^2} = \left( \frac{e^x - 1}{e^x + 1} \right)^2 \text{ ពិត}$$

ដូចនេះ  $f'(x) = \left( \frac{e^x - 1}{e^x + 1} \right)^2$  ចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត  $x$  ។

ខ) គូសតារាងអថេរភាពនៃ  $f$  ៖



## លំហាត់សិក្សាអនុគមន៍ច្រើនអិលពិសេស

យើងមាន  $f'(x) = \left(\frac{e^x - 1}{e^x + 1}\right)^2 \geq 0$  ចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត  $x$  នោះ  $f$

ជាអនុគមន៍កើនហើយបើ  $f'(x) = 0 \Leftrightarrow e^x - 1 = 0$  ឬ  $x = 0$  ។

$x$	$-\infty$	$0$	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	+
$f(x)$	$-\infty$	2	$+\infty$

៣.ក) ស្រាយបំភ្លឺថាកន្សោម  $f(x)$  អាចសរសេរជាពីរទម្រង់៖

$$f(x) = x + \frac{4}{e^x + 1} \quad \text{និង} \quad f(x) = x + 4 - \frac{4e^x}{e^x + 1}$$

យើងមាន  $f(x) = x + 2 - \frac{2(e^x - 1)}{e^x + 1} = x + \left[2 - \frac{2(e^x - 1)}{e^x + 1}\right] = x + \frac{4}{e^x + 1}$  ពិត

ហើយ  $f(x) = x + 2 - \frac{2(e^x - 1)}{(e^x + 1)} = x + 4 + \left[-\frac{2(e^x - 1)}{(e^x + 1)} - 2\right] = x + 4 - \frac{4e^x}{e^x + 1}$  ពិត

ខ) ទាញបញ្ជាក់ថាខ្សែកោង  $(C)$  មានអាស៊ីមតូតទ្រេតពីរតាងដោយ  $(d_1)$  និង  $(d_2)$

យើងមាន  $f(x) = x + \frac{4}{e^x + 1}$  និង  $f(x) = x + 4 - \frac{4e^x}{e^x + 1}$

ដោយ  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4}{e^x + 1} = 0$  និង  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4e^x}{e^x + 1} = 0$

នោះបន្ទាត់  $(d_1): y = x$  និង  $(d_2): y = x + 4$  ជាសមីការអាស៊ីមតូតទ្រេត

នៃក្រាប  $(C)$  រៀងគ្នាត្រង់  $+\infty$  និង  $-\infty$  ។

៤.គណនា  $f(x) + f(-x)$  រួចទាញថាចំណុច  $I(0, 2)$  ជាផ្ចិតឆ្លុះនៃក្រាប  $(C)$

## លំហាត់សិក្សាអនុគមន៍ច្រើនអិសពិសេស

យើងមាន  $f(x) = x + 2 - \frac{2(e^x - 1)}{e^x + 1}$  (1)

ជំនួស  $x$  ដោយ  $-x$  ក្នុង(1) យើងបាន៖

$$f(x) + f(-x) = -x + 2 - \frac{2(e^{-x} - 1)}{e^{-x} + 1} = -x + 2 + \frac{2(e^x - 1)}{e^x + 1} \quad (2)$$

បូកសមីការ(1)&(2) យើងបាន  $f(x) + f(-x) = 4$  ។

ដូចនេះ  $f(x) + f(-x) = 4$  ។

តាមរូបមន្ត  $f(x) + f(2a - x) = 2b$  នោះគេទាញ  $a = 0, b = 2$  ។

ដូចនេះ  $I(0, 2)$  ជាផ្ចិតឆ្លុះនៃក្រាប(C)។


៥.គណនា  $f(1)$  និង  $f(2)$  និងសង់ក្រាប(C) បន្ទាត់( $\Delta$ ), ( $d_1$ ), ( $d_2$ )៖

យើងមាន  $f(x) = x + 2 - \frac{2(e^x - 1)}{e^x + 1}$

ចំពោះ  $x = 1: f(1) = 1 + 2 - \frac{2(e - 1)}{e + 1} = 3 - 2 \times 0.5 = 2$

ចំពោះ  $x = 2: f(2) = 2 + 2 - \frac{2(e^2 - 1)}{e^2 + 1} = 4 - 2 \times 0.8 = 2.4$

ដូចនេះ  $f(1) = 2$  និង  $f(2) = 2.4$  ។



**លំហាត់ទី១៩**

គេឲ្យអនុគមន៍  $f$  កំណត់លើ  $\mathbb{R}$  ដោយ  $f(x) = 2(x+1)^2 e^x$

តាង  $(C)$  ជាក្រាបតំណាង  $f$  ក្នុងតម្រុយអរតូនរម៉ាល់  $(o, \vec{i}, \vec{j})$  ។

១) គណនាលីមីត  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  និង  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$  រួចទាញបញ្ជាក់ថាក្រាប  $(C)$

មានអក្សរអាបស៊ីសជាអាស៊ីមតូតដេក ។

២) គណនាដេរីវេ  $f'(x)$  រួចគូសតារាងអថេរភាពនៃ  $f$  ។

៣) កំណត់បីចំនួនពិត  $a, b, c$  ដោយដឹងថា  $F(x) = (ax^2 + bx + c)e^x$  គឺជា ព្រីមីទីវមួយនៃ  $f(x)$  លើ  $\mathbb{R}$  ។

៤) ចូរសង់ក្រាប  $(C)$  រួចគណនាផ្ទៃក្រឡានៃមណ្ឌលប្លង់ខណ្ឌដោយក្រាប  $(C)$  និងអក្សរអាបស៊ីសនិងបន្ទាត់  $x = -2, x = 0$  ។

( គេឲ្យ  $e = 2.7, e^{-1} = 0.4, e^{-3} = 0.05$  )

**ដំណោះស្រាយ**

១) គណនាលីមីត  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  និង  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

យើងមាន  $f$  កំណត់លើ  $\mathbb{R}$  ដោយ  $f(x) = 2(x+1)^2 e^x$

យើងបាន  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 2(x+1)^2 e^x = +\infty$

និង  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} 2(x+1)^2 e^x = 0$  ព្រោះ  $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$  ។

ទាញបញ្ជាក់ថាក្រាប  $(C)$  មានអក្សរអាបស៊ីសជាអាស៊ីមតូតដេក ៖

ដោយ  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$  នោះក្រាប  $(C)$  មានអក្សរអាបស៊ីសជាអាស៊ីមតូតដេក។

២) គណនាដេរីវេ  $f'(x)$  រួចគូសតារាងអថេរភាពនៃ  $f$

យើងមាន  $f(x) = 2(x+1)^2 e^x$

$$\begin{aligned} \text{យើងបាន } f'(x) &= 4(x+1)e^x + 2(x+1)^2 e^x \\ &= 2(x+1)e^x [2 + (x+1)] \\ &= 2(x+1)(x+3)e^x \end{aligned}$$

## លំហាត់សិក្សាអនុគមន៍ច្រើនអិលសេស

ដូចនេះ  $f'(x) = 2(x+1)(x+3)e^x$  ។

បើ  $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x+1=0 \\ x+3=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=-1 \\ x=-3 \end{cases}$

យើងបាន  $f(-3) = \frac{8}{e^3} = 0.4$  និង  $f(-1) = 0$

$x$	$-\infty$	$-3$	$-1$	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	+
$f(x)$	0	0.4	0	$+\infty$

៣) កំណត់បីចំនួនពិត  $a, b, c$

ដើម្បីឲ្យ  $F(x) = (ax^2 + bx + c)e^x$  គឺជាព្រីមីទីវមួយនៃ  $f(x)$  លើ  $\mathbb{R}$

កាលណា  $\forall x \in \mathbb{R} : F'(x) = f(x)$

យើងមាន  $F'(x) = (2ax + b)e^x + (ax^2 + bx + c)e^x$   
 $= [ax^2 + (2a + b)x + (b + c)]e^x$


យើងបាន  $[ax^2 + (2a + b)x + (b + c)]e^x = 2(x^2 + 2x + 1)e^x$

យើងទាញ  $\begin{cases} a = 2 \\ 2a + b = 4 \\ b + c = 2 \end{cases}$  នោះ  $a = 2, b = 0, c = 2$

ដូចនេះ  $a = 2, b = 0, c = 2$  ។

ហើយ  $F(x) = 2(x^2 + 1)e^x$  ។

៤) សង់ក្រាប(C)



គណនាផ្ទៃក្រឡានៃមណ្ឌលប្លង់ខណ្ឌដោយក្រាប(C) និងអក្សរអាប៉ូស៊ីស និងបន្ទាត់  $x = -1$ ,  $x = 0$  ៖

$$\text{យើងបាន } S = \int_{-1}^0 f(x) dx = [F(x)]_{-1}^0 = F(0) - F(-1)$$

$$\text{ដោយ } F(x) = 2(x^2 + 1)e^x \text{ នោះ: } F(0) = 2, F(-1) = \frac{4}{e}$$

$$\text{ដូចនេះ: } S = 2 - \frac{4}{e} = \frac{2(e-2)}{e} \quad (\text{ឯកតាផ្ទៃ})$$

**លំហាត់ទី២០**

គេឲ្យ  $f$  ជាអនុគមន៍កំណត់លើ  $(0, +\infty)$  ដោយ  $f(x) = \frac{\ln x}{x}$  ។

(c) ជាក្រាបតាងអនុគមន៍  $f$  ក្នុងតម្រុយអរតូនរម៉ាល់  $(o, \vec{i}, \vec{j})$  ។

១) រកលីមីត  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  និង  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$  រួចបញ្ជាក់សមីការអាស៊ីមតូតឈរ និង អាស៊ីមតូតដេកនៃក្រាប(c) ។

២) គូសតារាងអថេរភាពនៃអនុគមន៍  $f$  ។

៣) ចូរសង់ក្រាប(c) ។ គេយក  $e = 2.7$ ,  $\ln 2 = 0.7$  ។

**ដំណោះស្រាយ**

១) រកលីមីត  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  និង  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ :

យើងមាន  $f(x) = \frac{\ln x}{x}$

យើងបាន  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$

ហើយ  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} \times \lim_{x \rightarrow 0^+} (\ln x) = -\infty$

ព្រោះ  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$  និង  $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\ln x) = -\infty$  ។

ដូចនេះ  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$  និង  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$  ។

បញ្ជាក់សមីការអាស៊ីមតូតឈរ និង អាស៊ីមតូតដេកនៃក្រាប(c) :

ដោយ  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$  និង  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$  នោះបន្ទាត់  $x = 0$  ឬអក្សរ(oy)

ជាអាស៊ីមតូតឈរ និងបន្ទាត់  $y = 0$  ឬអក្សរ(ox) ជាអាស៊ីមតូតដេក។

២) គូសតារាងអថេរភាពនៃអនុគមន៍  $f$

យើងមាន  $f(x) = \frac{\ln x}{x}$  ជាអនុគមន៍មានដែនកំណត់  $D_f = (0, +\infty)$

ដេរីវេ  $f'(x) = \left(\frac{\ln x}{x}\right)' = \frac{(\ln x)'(x) - (x)'(\ln x)}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}$  ។

## លំហាត់សិក្សាអនុគមន៍ជ្រើសរើសពិសេស

មានសញ្ញាដូច  $(1 - \ln x)$  គ្រប់  $x \in D_f$  ។

បើ  $f'(x) > 0$  នោះ  $1 - \ln x > 0$  ឬ  $\ln x < 1$  ឬ  $0 < x < e$  ។

បើ  $f'(x) = 0$  នោះ  $1 - \ln x = 0$  ឬ  $\ln x = 1$  ឬ  $x = e$  ។

បើ  $f'(x) < 0$  នោះ  $1 - \ln x < 0$  ឬ  $\ln x > 1$  ឬ  $x > e$  ។

ចំពោះ  $x = e$  នោះ  $f(e) = \frac{\ln e}{e} = \frac{1}{e} = 0.4$  ។

$x$	0	$e$	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	$-\infty$	0.4	0

៣) សង់ក្រាប(c)

